




Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


**Vogelwachtrapport Rottumerplaat
Broedseizoen 2025
Marcel Huijgens en Frank Oosterhoff**



Internationale Waddenzee met in het rode vlak de Rottums.



De Rottums met in het groene vlak Rottumerplaat.



Rottumerplaat met toponiemen en in de gekleurde vlakken de behuizing.



Behuizing met de nummering van de puindammen.



Benaming van de uitzichtpunten rondom de behuizing.

Uitgelicht

Voor de vogelwachters die een seizoen lang van de natuur van Rottumerplaat mochten genieten is ieder jaar een topjaar en alles wat ze meemaakten even bijzonder. In 'uitgelicht' proberen we, inmiddels weer met voet aan vaste wal, te benoemen wat er uitsprong. Wat ons opviel ten opzichte van vorige jaren.

Zand, zand, zand

Het eiland verandert ieder jaar van vorm. Water en wind verplaatsen continue zand. De stuifdijk is afgelopen winter, anders dan vorige jaren, niet afgekalfd.

Ten zuiden van de Stuifdijk is de verzanding van het wad waarschijnlijk de reden dat zeegras er geen geschikt biotoop meer vond.

Ten noorden van de Stuifdijk wordt de Nieuwe Oostpunt telkens weer een centimetertje hoger. Dat heeft tot gevolg dat het er vaker droog blijft, en er dit jaar voor het eerst Dwergsterns, Noordse Stern en Scholeksters een broedpoging hebben gedaan. De eieren spoelden helaas weg met een springtij.

Nieuwe plant: Zeealant


Op de lage kwelder zijn zaden of wortelstokken van de Zeealant aangespoeld en tot groei en bloei gekomen. Eerste keer op Rottum en na de slikken bij Goeree, de schorren op Texel, Griend en de kwelder op Schiermonnikoog pas de 5^e plek in Nederland waar deze plant voorkomt.



De Zeealant, niet te missen geel in een overdadig paars, groen en zilver landschap.

Doelsoorten Natura 2000

Steeds meer vogelsoorten weten zich als broedvogel te vestigen op Rottumerplaat. Het aantal dat in Natura2000 genoemd wordt als doelsoort voor de Waddenzee is de laatste 25 jaar ongeveer stabiel.



Ontwikkeling van het aantal broedvogelsoorten de afgelopen ruim 50 jaar op Rottumerplaat

Nieuw waren vastgestelde territoria van Rietzanger, Roodborst en Sprinkhaanzanger.

Niet al die soorten zijn ieder jaar met evenveel broedparen vertegenwoordigd, ook is het voor veel soorten ingewikkeld of onmogelijk iets zinnigs te zeggen over het broedsucces.

Van de soorten die in Natura 2000 zijn benoemd als broedvogeldoelsoort voor de Waddenzee of Noordzeekustzone waren, vergeleken met de vorige jaren op Rottumerplaat, **de Lepelaar, Bruine Kiekendief, Bontbekplevier, Visdief, Noordse Stern en Dwergstern** in 2025 ruim vertegenwoordigd.

Van de **Kluut** zagen we daarentegen (al de laatste jaren) minder broedparen dan waar we gewend aan waren geraakt.

Extra kolonies Lepelaar

Ook dit jaar weer een druk bezette kolonie Lepelaars. En nog succesvol bovendien met bijna één vliegvlug jong per broedpaar.


Daarnaast een zestal succesvolle nesten in twee nieuwe kolonietjes, dicht bij de Stuifdijk.

Record aantal kiekendiefnesten

Dit jaar zowaar acht nesten van de Bruine Kiekendief. Nooit eerder waren het er zo veel. Niet allemaal even succesvol maar toch negen jonkies aan het einde van het seizoen boven de kwelder op jacht.

Jonge Brandgansjes

Nadat vorig jaar reeds een eerste nest met eieren van de Brandgans was gevonden, is er dit jaar voor het eerst een waarneming van ouders met jongen in de slenken van Rottumerplaat.



De eerste jonge brandgansjes, mogelijk niet alle zes van dit ouderpaar.

Broedende Kokmeeuwen werden nodeloos gemist


Net als vorig jaar ook dit jaar nauwelijks broedende Kokmeeuwen op de puindammen. Dit leek twijfel te zaaien bij de Visdieven of de puindammen zonder de verdediging van de Kokmeeuw een geschikte broedplaats zou zijn. Ze leken er lang over te doen om tot nestelen te komen. Uiteindelijk zijn bijna alle eieren en net uitgekomen jonkies ten prooi gevallen aan de grotere meeuwen.

Succesvolle Tapuiten

In ieder geval twee en wellicht zelfs drie broedparen Tapuit dit jaar waarbij we een groot aantal jonkies groot hebben zien worden.

Zeearend kind aan huis

Het gaat goed met de Zeearend in Noord Nederland. En dat is ook te merken op Rottumerplaat. Waar door de jaren heen een Zeearend op bezoek een uitgebreide notitie verdiende in het vogelwachtersverslag en we de afgelopen jaren al vermeld werden met een handvol bezoeken per seizoen telden wij 25 dagen met één of meerdere Zeearenden.



Recordaantal bezoeken van de Zeearend

Veel Scholeksterneuten, weinig jongen

Nog niet eerder werden er zoveel Scholeksterneuten gevonden in het CHRIPS aandachtsgebied langs de stuifdijk. Maar van deze ruim 120 met eieren gevulde nestjes werden slechts 7 jongen vliegvlug.



Liggend langs de stuifdijk, de intensief gevolgde scholeksterneuten.

Strandplevier en Bontbekplevier succesvol

De Bontbekplevieren waren er maar druk mee. Van de 8 broedparen vonden we uiteindelijk 12 nestjes. Niet allemaal even succesvol maar volop schattige jonkies en we zagen er meerdere vliegvlug worden. Ook bij het paartje Strandplevier op de schelpenstrandjes bij de Zuidwesterduintjes zagen we pas uitgekomen jonkies.



Jonge Strandplevier

Waar bleven de Eiderkuikens?

Eiderkuikens verzamelen zich in crèches om zo door meerdere volwassen eidervrouwtjes verdedigd te worden tegen de hongerige meeuwen. Niet alleen zagen we dit seizoen maar weinig jongen in crèches, ook waren die verdwenen (of op) voordat de kuikens ook maar een beetje groter konden groeien.

Hop en weer door

Krenten uit de pap voor de vogelaar vormden de Hop, Grauwe Fitis, Iberische Tjiftjaf en de op Rottumerplaat even zeldzame Meerkoet.



Hop

Opvallend weinig dode zeehonden

Zowel de volwassen zeehonden als de huilers hadden een goed jaar, of spoelden de dode exemplaren ergens anders aan.



Zeehonden vormen het vaste welkomstcomité.

Minder? Afval

De hoeveelheid afval in de jaren na de ramp met de MSC Zoe wordt steeds weer wat minder. Dat is echter geen reden voor een feestje, er spoelen of waaien nog steeds dagelijks felicitatieballonnen aan in de vloedlijn.



'Vrolijke' verzameling felicitatieballonnen

Nieuwe soorten nachtvlinders

Er zijn 12 nieuwe soorten nachtvlinders voor Rottumerplaat gevangen, maar ook 9 soorten die vorig jaar nieuw waren zijn teruggevonden.



Bont schaapje, nieuw voor Rottumerplaat



Inhoudsopgave

Uitgelicht	1
Dankwoord	4
1 Inleiding.....	5
2 Toezicht	12
3 Bezoekers	13
<i>Blog: Bezoek</i>	14
4 (Sociale) media	15
5 Vogels.....	17
5.1 Avifauna	17
<i>Blog: Ganzenkuikens</i>	59
5.2 Broedvogels	61
5.3 Hoogwatervluchtplaatstellingen	101
6 Zoogdieren.....	107
7 Insecten	111
7.1 Dagvlinders	111
7.2 Nachtvvlinders	113
7.3 Overige insecten	115
8 Flora	116
9 Aanbevelingen	117
Bijlagen:	
- Afgelezen ringen vogels	118
- Nieuwe geringd	127
- Voormalige broedende vogels	128
- Historische cijfers broedvogels	130
- Overige waarnemingen	138
- Meerjarenoverzicht flora	145

Rottumerplaat is een droom voor elke waddenliefhebber. En voor de meesten blijft het een droom, want Rottumerplaat is de plek in Nederland die we met rust laten. Die rust vormt gelijk het aantrekkelijke van deze plek. Rust die nooit saai is, altijd weer iets te zien of te beleven. Afwisselend eb en vloed bepaalt het dagelijks ritme. Springvloed zorgt met soms uitpuilende hoogwatervluchtplaats voor een twee wekelijks ritme. Het broedseizoen en dus het komen en gaan van de vogels die hier of elders broeden bepaalt het ritme waar we volledig in ondergedompeld mogen zijn. De wisselende seizoenen zorgen voor de inkleuring van het adembenemende decor. Trager is het tempo van de jaarlijkse stormen en bijbehorende zandverplaatsingen. De effecten nemen we waar, maar bijna verstild, als op een foto.

Voor Marcel was het de eerste keer langdurig op Rottumerplaat verblijven, voor Frank voelde het als thuiskomen. We pikten beide een ander ritme als eerste op, maar wisten elkaar goed deelgenoot te maken van hetgeen we ervoeren en snel nam het eiland de leiding over.

Hier lijkt het alsof je even alleen op de wereld bent, maar los ervan ben je niet. Hoeft niet, kan niet. Daarom dank aan de mensen aan de vast wal die dit verblijf mogelijk maakten en veraangenaamden. Collega's bij Rijkswaterstaat die zich hebben ingezet zodat wij hier konden verblijven en ons werk konden doen. Schipper en bemanning van de Harder die ons, voedsel en bezoek brachten. En dat bezoek dat ons dan weer onmisbare kennis, vriendschap en verstrooiing brachten. Saskia vormde onze onmisbaar gebleken logistieke hub in het Noorden, waarvoor dank. De teksten uit het verslag van Addo (2021) zijn de basis waarop dit verslag steunt, dank. Erg fijn dat het Wina lukte om haar vakantieplannen om te gooien zodat er voor Marcel een minder haastige overgang naar zijn vaste baan ontstond.

Grootste dank gaat uit naar degenen die we even moesten missen, en waar we maar al te graag weer naar terugkeren.

Om vervolgens weer te dromen over terugkeren.



Vlnr: Marcel Huijgens en Frank Oosterhoff

1. Inleiding

Rottumerplaat vormt samen met Rottumeroog en Zuiderduin (oftewel De Rottums) een belangrijk onderdeel van het internationale Waddengebied dat zich uitstrekt van Den Helder tot het Deense Esbjerg. Rond 1950 was Rottumerplaat slechts een zandbank. Vanaf dat jaar startte Rijkswaterstaat met de aanleg van de Stuifdijk, zodat Rottumerplaat als werkeiland zou dienen bij de voorgenomen inpoldering van de Waddenzee. Deze plannen verdwenen van tafel. Mede dankzij de Stuifdijk groeide Rottumerplaat uit tot een eiland van een kleine duizend hectare. Na jaren van afkalven ontstonden langs het Noordzeestrand nieuwe duinen. De afkalving van de westzijde, waarbij de Kop van de Stuifdijk ieder jaar enkele tientallen meters korter wordt, is nog altijd aan de gang.

In 1991 besloot eigenaar en beheerder Rijkswaterstaat tot het staken van de kustverdediging op de Rottums. Sindsdien wordt Rottumerplaat volledig aan het spel van zand, wind en water overgelaten. De Stuifdijk is echter robuust genoeg om het hart van het eiland nog een tijd op zijn plaats te houden. Enigszins verscholen in de oostelijke Kop van de Stuifdijk staat de voormalige behuizing van de duinarbeiders. In de hoogtijdagen werkten hier door de week zo'n 20 tot 24 man aan het vastleggen van de kustlijn door het planten van rijshouten schermen, het kruien van zand en het aanplanten van helm. Deze behuizing is nu in gebruik als vogelwachtershuis. Rottumerplaat is een van de eilanden in het Groninger deel van de Waddenzee waar jaarlijks het broedseizoen (april-augustus) bewaking plaatsvindt door vogelwachters. In 2025 gebeurde dat voor de 45e keer. De bewaking door vogelwachters gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat, die tegenwoordig het dagelijks beheer over de Rottums voert. Het vogelwachtseizoen van 2025 liep van 3 april tot en met 7 augustus.

De Rottums en omgeving zijn onder de Omgevingswet (ex. Wet natuurbescherming) geplaatst. Het gebied heeft een Natura 2000 aanwijzing en geldt als referentiegebied. Dat houdt in dat er niet gevestigd wordt op vissen, garnalen en schelpdieren. Zo kan de natuur zich

ongestoord ontwikkelen en kan deze ontwikkeling vergeleken worden met de ontwikkelingen in de rest van de Waddenzee. Vanwege de gevoeligheid voor verstoring van trekvogels en zeehonden zijn Rottumeroog en Rottumerplaat voor publiek afgesloten volgens art. 2.45 van de Omgevingswet.

Jaarlijks worden de waarnemingen en bevindingen van het betreffende vogelwachtseizoen op Rottumerplaat door de vogelwachters in een rapport samengevat. Tijdens het vogelwachtseizoen 2025, waarvan dit rapport verslag doet, zijn zogenaamde weekrapportages per mail aan Rijkswaterstaat verzonden. Alle gegevens van HVP-tellingen en broedvogelmonitoring zijn ingevoerd op het invoerportaal (Avimap) van Sovon. De tellingen van de vlinderroutes zijn doorgegeven aan het Meetnet Vlinderstichting.

Voor de aanpak van onze werkzaamheden hebben we de handleiding monitoring Rottumerplaat 2025 (Pot, Postma, Ubels, Koffijberg en Dijkshoorn, 2025) gebruikt. Voor de verslaglegging hebben wij met toestemming gebruik gemaakt van het vogelwachtersrapport 2021 (van der Eijk en Oosterhoff, 2021). Ook hebben we de vogelwachtrapporten van 2022 (van der Aa & Vonk, 2022) en 2024 (Miedema & de Vries, 2024) veelvuldig geraadpleegd.

1.1 Werkzaamheden

Het takenpakket van de vogelwachters op Rottumerplaat bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

- Broedvogelmonitoring
- Doen van HoogwaterVluchtPlaats-tellingen (HVP-tellingen)
- Het in kaart brengen van overige flora en fauna
- Het voorkomen, registreren en melden van verstoring door vliegtuigen, boten en personen
- Het ruimen van vuil
- Het doen van verslag via de (sociale) media

Naast de basistaken werd op verzoek van de onderzoekers en met toestemming van Rijkswaterstaat meegewerkt aan het CHIRP-onderzoek naar Scholeksters van Sovon (Bruno Ens), het Reproductiemeetnet Waddenzee voor Noordse Stern en Visdief van Sovon (Derick Hiemstra) en het lepelaarsonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (Petra de Goeij).

1.2 Betrokken overheidsdiensten

Vanaf 2024 zijn twee overheidsinstanties zijn betrokken bij het dagelijks beheer van de Rottums, te weten: Rijkswaterstaat (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en de Waddenunit van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

-Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de eilanden, de gebouwen en de het omringende water.

-De Waddenunit houdt toezicht en doet de handhaving voor het gesloten gebied rondom de Rottums (art 2.45). Dat combineren zij met het vervoer en het leveren van de bevoorrading op de Rottums.

Rijkswaterstaat heeft per 1 januari 2024 het beheer van Staatsbosbeheer overgenomen, die sinds 2007 verantwoordelijk was voor het natuurbeheer op Rottumerplaat.

1.3 Wettelijk kader en afspraken

In deze paragraaf wordt ingegaan op de internationale, nationale en provinciale verplichtingen en afspraken die zijn gemaakt over het beheer en de verantwoording ten aanzien van de biodiversiteit in de Waddenzee. Ook wordt ingegaan op de unieke positie die het gebied heeft voor met name trekvogels. Daarna volgt een meer praktische toelichting op de monitoringsverplichtingen en -inspanning. Tot slot wordt ingegaan op het toezicht op Rottum en welke bijdrage de aanwezigheid levert aan educatie, recreatie en Werelderfgoed-toerisme.

Internationaal

Rottumerplaat maakt deel uit van de internationale afspraken met betrekking tot de natuurbescherming en -ontwikkeling van het natuurgebied Waddenzee in internationale context. De basis daarvoor is gelegd tijdens *Convention on Migratory Species* in Bonn (1979). Daarin namen de betrokken landen, waaronder Nederland, de verplichting op zich onderzoek te doen aan trekvogels. Tijdens de driejaarlijkse conference is deze afspraak meerdere malen bevestigd (o.a. Ramsar convention). Het betreft wereldwijde afspraken, met name waar het trekvogels betreft. Deze afspraken gaan over samenwerking in beheer en monitoring langs de Oost-Atlantische trekroute en afspraken in de trilaterale samenwerking voor de Waddenzee (<http://www.waddensea-secretariat.org>). De vogeltellingen op Rottumerplaat maken

onderdeel uit van de dataverzameling. Het Trilateral Monitoring and Assessment Plan (TMAP) is daarvoor leidend. Periodiek wordt over de internationale monitoringresultaten gerapporteerd in het Quality Status Report.

Nederland heeft zich samen met Duitsland en Denemarken verplicht zorg te dragen voor bescherming en ontwikkeling van de Outstanding Universal Values van het Unesco Natural World Heritage Waddensea (Common Wadden Sea Secretariat, 2016). Monitoring van waarde en trends in soortontwikkelingen en bescherming van die waarde is de basis van de toekenning van de Werelderfgoedstatus.

Samenwerking vogeltrekroute

In onderstaande punten uit de Tønder Declaration (Common Wadden Sea Secretariat, 2014) is de verplichting over de intensivering van de monitoring herbevestigd. Daarin staat onder meer dat

Nederland, Duitsland en Denemarken:

1. Erkennen het mondiale belang van de Waddenzee voor trekvogelpopulaties, wat een belangrijk kenmerk is van het Werelderfgoed Waddenzee, en merken met zorg op dat veel populaties in aantal afnemen.
2. Waarderen de vooruitgang die is geboekt binnen het Waddenzee Flyway Initiative, zoals het consolideren van een netwerk voor de bescherming van trekvogels, waaronder capaciteitsopbouw, monitoring en het ontwikkelen van statusbeoordelingen de Trilaterale Regeringsconferentie 2014 op trekroutheniveau, in het leven roepen als reactie op het besluit van het Werelderfgoedcomité om de samenwerking te versterken bij het beheer en onderzoek van de Afrikaans-Euraziatische vogeltrekroutes met de relevante staten.
3. Komen overeen de samenwerking bij beheer en onderzoek van de Oost-Atlantische vogeltrekroutes voort te zetten en waar nodig uit te breiden, samen met relevante gouvernementele en niet- gouvernementele organisaties.

Het Trilaterale Monitorings- en BeoordelingsProgramma (TMAP) en de 'internationale flyway-afspraken' staan aan de basis van de monitoringinspanning voor de Rottums. Als professioneel natuurbeheerder voldoen Rijkswaterstaat, de Waddenunit van het Ministerie van LVVN met veel partners zoals Sovon, aan de verplichtingen. De ondergrens

(baseline) is vastgelegd in nationale operationele plannen zoals het beheerplan Natura 2000 Waddenzee.

Beheertaken

Vanuit het wettelijk kader, internationale afspraken en het Natura 2000-beheerplan worden de volgende beheertaken uitgevoerd op Rottumerplaat.

1. Jaarlijks worden broedvogelkarteringen uitgevoerd. Maandelijks worden maandmaxima van de aantallen wadvogels op de hoogwatervluchtplaatsen (HVP's) vastgesteld.
2. Jaarlijks wordt een soortenlijst voor hogere planten geactualiseerd. Om de 10 jaar lagere planten namelijk blad-, lever- en korstmossen.
3. Jaarlijks wordt via een vlinderroute de dagvlinderdichtheid en aanwezige soorten bepaald.
4. Zeehonden, aanwezige zeehondenligplaatsen en reproductie worden jaarlijks bijgehouden.
5. Iedere 5 jaar worden PQ's uitgevoerd (gedetailleerde vegetatie (opnames).
6. De habitatrichtlijnsoort nauwe korfslak wordt gemonitord. Deze soort is op de kwelders van Rottumeroog en Rottumerplaat aangetroffen.
7. Zeegrasvegetaties worden gemonitord.

Broedvogels

De broedvogelinventarisaties op de Rottums zijn onderdeel van het nationale Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en het Trilateral Monitoring and Assessment Programma (TMAP), dat in de Waddenzee samen met Duitsland en Denemarken wordt uitgevoerd. Rijkswaterstaat is mede opdrachtgever van het NEM (zie <http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/or> ganisatie) en participeert ook in het trilaterale TMAP-programma. Meetdoel van het NEM is onder andere het leveren van betrouwbare populatieschattingen, trends en verspreidingsgegevens van broedvogels (en watervogels), zowel landelijk als voor afzonderlijke Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld de Waddenzee). Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin zijn vaste telgebieden voor NEM/TMAP waar jaarlijks alle voorkomende broedvogels worden geteld. Zonder die gegevens zou voor een aantal belangrijke soorten gaten vallen en is het niet

mogelijk de meetdoelen te behalen die NEM/TMAP stellen.

Watervogels

De kaders voor de watervogels zijn dezelfde als voor de broedvogels (NEM/TMAP). De opzet van deze tellingen is anders. Er is gekozen voor een opzet om 5-6 keer per jaar de hele Waddenzee integraal te tellen, dus alle telgebieden te bezoeken. Tegelijk is er een serie gebieden nodig die tenminste eenmaal per maand worden geteld, om aan de hand van het seizoenspatroon een schatting te kunnen maken voor de hele Waddenzee over het hele jaar.

Handhaving en sociale controle

Het toezicht, de handhaving en de vervolging van overtredingen wordt voor de hele Nederlandse Waddenzee momenteel als onvoldoende beoordeeld. Dit wordt gesignaleerd in de intentieverklaring Handhaving (OBW december 2018, in het beheerplan Natura 2000 Waddenzee 2016), door de werkgemeenschappen kombergingen en de handhavers zelf. De volledige handhavingsketen start met voorlichten en bewustwording en sluit af met repressie.


De vogelwachtposten van Rottumeroog en Rottumerplaat zijn belangrijke 'ogen en oren' voor dit gebied, van het oostpunt van Schiermonnikoog, Simonszand tot aan de Eems. Enerzijds omdat de vogelwachters het gebied in de gaten houden, anderzijds omdat bij gebruikers van het omringende gebied bekend is dat er toezicht is (preventieve werking). Mede dankzij de vogelwachters en de handhavers krijgen de vogels en zeehonden op Rottumerplaat rust.

Voorlichting en educatie

Er is een breed gedragen ontwikkeling om de kernwaarden van de Waddenzee, waarmee ze is erkend als een UNESCO Natuurlijk Werelderfgoed Waddenzee, te promoten. In een goede balans tussen beschermen en beleven. Daarvoor is een trilaterale Werelderfgoed marketingstrategie afgesproken. De Gebiedsagenda Wadden 2050 (opvolger Structuurvisie Waddenzee 2006, in voorbereiding) en het Investeringskader Wadden (IKW 2016, investeringskaderwaddengebied.nl) geven sturing. Actuele informatie over de waarden is nodig voor voorlichting, educatie en trots. Steeds meer wordt duidelijk dat narratieve communicatie in de 21e eeuw belangrijk is, onder meer via sociale media

De vogelwachters zijn met hun lokale actuele kennis ambassadeurs van de Rottums. De interactieve communicatie van wadwachters op verschillende plekken in het Waddengebied, en in deze dus ook de vogelwachters van Rottumeroog en Rottumerplaat, is een cruciaal onderdeel van de borging van de *Outstanding Universal Values*.


Voor in dit verslag is een vergrote weergave van onderstaande satellietfoto te vinden. Daarop zijn de veelgebruikte topografische namen en locaties op Rottumerplaat vermeld.



De nummering van de Puindammen bij de Behuizing is te vinden op een separate kaart.



Rottumerplaat is continu in beweging, van afslag aan de Stuifdijk tot vorming van de Nieuwe Binnenzee. Met een kaartje van de 1m+NAP-lijn, is duidelijk hoe het eiland, door de jaren heen, veranderd van vorm.



Bron: Rolf Boerema, RWS CIV Mobiel Meten


Ten noorden en zuiden van de Stuifdijk lagen in 2021 aan de westzijde grote washovers. In 2025 is geprobeerd deze met GPS in te lopen, maar dit was nagenoeg onmogelijk door de vele slenken en onduidelijke grenzen. Wel is duidelijk dat het eiland nog steeds vaak en verder overspoeld wordt vanaf de westkant.



8

Dynamiek-Hoogtekaart Rottumerplaat

Rijkswaterstaat heeft een kaart gemaakt waarop wordt aangegeven hoe de hoogtes in de afgelopen 5 jaar veranderd zijn. Duidelijk wordt dat de Noord-Oostpunt van het eiland flink hoger aan het worden is. Op deze plek hebben dit seizoen Dwergsters, Noordse Sterns en Scholeksters proberen te broeden. Hun legsels zijn bij een hoogwater weggespoeld.



Vershil in hoogte 2019-2025 Rottumerplaat. Rood de grootste sedimentatie (+3cm), blauw de sterkste erosie (>-3cm). Bron: Rolf Boerema Rijkswaterstaat CIV Mobiel Meten

1.5 Het weer tijdens het broedseizoen

De weersomstandigheden bepalen een deel van het succes van het broedseizoen. Zon, regen, wind en, op een eiland in zee zonder omringende dijken, ook het tij.

Wat het weer betreft troffen we het uitstekend. Dat vindt zijn weerslag in de uitgebreide beschrijvingen die het KNMI iedere maand maakt van de landelijke meteorologische gegevens. Ze zijn terug te lezen op <https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en->

[seizoensoverzichten/](#), maar de titels zeggen eigenlijk al wel genoeg.

April: Zeer warm, zeer zonnig en vrij droog


Mei: Vrij zacht, droog en zeer zonnig

Juni: Zeer warm, zeer zonnig en droog


Juli: Warm en iets aan de zonnige en droge kant.

De eerste week van Augustus werd dit weerbeeld niet anders.

Het weer in cijfers





Wind Huibertgat dit seizoen



● Records — Norm.
— Gemid. Temp — Max. Temp
— Min. Temp

Temperatuur [°C] Lauwersoog dit seizoen




1.6 Hoogwaterstanden

Huibertgat, gelegen ten Noordwesten van Rottumerplaat, is de dichtstbijzijnde locatie waar de hoogwaterstanden door Rijkswaterstaat worden gemeten.

Het water bereikt hier het hoogste punt ongeveer 25 minuten voor Rottumerplaat. Bij een waterstand van 130 cm +NAP omringt het water de puindammen en begint het laagste gedeelte van de Zuidkwelder onder te lopen. Vanaf 135cm +NAP verdwijnt ook de Oostkwelder, de Boschplaat en een gedeelte van het Noorderstrand onder water.






Onderstaande illustratie geeft op de kaart aan welke gedeelten onderlopen bij de verschillende getijhoogten.

Hoogteinformatie is uit 2024.



Slechts enkele dagen voor de aanvang van het vogelwachterseizoen bereikte het water de enorm hoge stand van +184 cm +NAP. De gevolgen die wij daarvan konden waarnemen waren de enorme plassen op bijna alle delen van Rottumerplaat, behalve stuifdijk en duintjes aan de buitenranden van Rottumerplaat.

Of er bijvoorbeeld veel ganzennesten zijn weggespoeld en of er lepelaars opnieuw hebben moeten beginnen hebben wij niet kunnen constateren. Tijdens het broedseizoen is er tweemaal een periode van verhoogde waterstanden geweest, waarbij we beide keren hebben kunnen constateren dat er nesten van sterns, plevieren en scholeksters onder water kwamen te staan of weg zijn gespoeld. Na het hoge water werd op sommige nesten weer plaatsgenomen. Van broedparen die eieren of jongen kwijt zijn geraakt hebben we, wanneer ouders geringd waren, kunnen vaststellen dat ze soms net iets meer dan een week later al weer op een nieuw nest met eieren zaten. Herlegfels zagen we overigens niet alleen na wegspoelen maar veel vaker ook na predatie. Met Rijkswaterstaat spraken we in aanloop naar het seizoen af dat we niet zouden ingrijpen bij hoogwater, slechts zouden documenteren wat de schade was. Dit in tegenstelling tot de recent ontstane gewoonte om eieren of nog niet vliegvlugge jongen tijdelijk binnen te halen.





2 Toezicht

Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin maken deel uit van het Natura 2000-gebied 'Waddenzee' en vallen onder art. 2.45 van de Omgevingswet. Zonder vergunning van bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen) is de toegang tot het eiland verboden.

In de periode van 15 mei tot en met 1 september zijn ook de tussenliggende zandplaten en het geulsysteem tussen Rottumeroog en Rottumerplaat (het Schild) niet toegankelijk. Eén van de kerntaken van de vogelwachters op Rottumerplaat is het bewaken van het eiland ter voorkoming van verstoring van flora en fauna. Luchtvaart, scheepvaart, wadlopers en vuil kunnen mogelijk verstoring veroorzaken. Wekelijks is een rapportage opgemaakt en naar Rijkswaterstaat gestuurd. In het geval van overtredingen op het wad/water is direct contact gezocht met de Waddenunit, die verantwoordelijk is voor de handhaving. In geval van overtredingen in de lucht is direct contact gezocht met Rijkswaterstaat.

2.1 Luchtvaart

Boven de gehele Waddenzee geldt voor de burgerluchtvaart een minimale vlieghoogte van 450 meter. Uitsluitend bij slecht zicht of bij de aanwezigheid van een wolkendeck boven de 450 meter is lager vliegen toegestaan. De minimale vlieghoogte is dan 300 meter.

Aan de vogelwachters de taak om de vliegbewegingen boven Rottumerplaat in de gaten te houden. In het geval de vlieghoogte niet voldoende leek en/of er sprake was van verstoring, werd het registratienummer van het toestel vastgelegd en het toestel indien mogelijk gefotografeerd, bij voorkeur inclusief de horizon. Zo kan eventueel achteraf via een formule de vlieghoogte worden bepaald. Gelijktijdig is getracht het vliegtuig of de helikopter te lokaliseren via de websites

www.flightradar24.com en/of

www.flightaware.com. Regelmatig werd een geobserveerd vliegtuig niet aangegeven op één of beide websites. Meerdere keren leek het erop dat de transponder was uitgezet. Dan verdween een vliegtuig van de radar om er later elders weer op te verschijnen.

De minimale toegestane waarde op de hoogtemeter is berekend zoals in het vogelwachtersrapport uit 2022 (van der Aa & Vonk 2022). De gerapporteerde vliegtuigen zijn niet opgenomen in deze versie van dit verslag in verband met de privacy van de betrokken personen.

Onze indruk is dat de lokale vliegtuigjes (Borkum, Groningen) zich prima aan de afspraken houden. Het zijn de incidentele vluchten (hoogseizoen, niet lokaal) over de Waddenzee die laag vliegen en verstoring veroorzaken. Andere categorie laag vliegende vliegtuigen zijn die van overheidsinstanties (defensie, politie, kustwacht, Rijkswaterstaat); ook zij verstoren op die momenten.

2.2 Wadlopers en scheepvaart

Wij hebben zelf éénmaal ongewenste bezoekers op het eiland geconstateerd: op 26 juli troffen we verse voetstappen aan op het Zuidwesterstrand.

De bemanning van de Harder heeft één ander schip geverbaliseerd i.v.m. het betreden van het eiland; dat bleek uit foto's die men daarvan zelf op sociale media had gedeeld.

2.3 Zwerfafval

Vanaf april is over het hele eiland zwerfafval opgeruimd. Opruimen was een continu proces. In het begin van het vogelwachtersseizoen gingen elk veldbezoek vuilniszakken mee, die onderweg werden gevuld. Eigenlijk viel de hoeveelheid rommel dit jaar mee vergeleken met ons beeld van vier jaar geleden. Er werden nog enkele spullen gevonden die in 2019 van de MSC Zoe zijn gevallen; een LED-kaars en combat-verkleedsetje gevonden.

Tussen begin mei en eind juli is weinig tot geen vuil opgeruimd om verstoring van de broedvogels te voorkomen. In totaal zijn er 4 big bags met afval opgeruimd.

Dit jaar hebben we extra aandacht besteed aan aanwaaiende en aanspoelende ballonnen. We schreven er één van onze [vogelwachtersblogs](#) over.

3. Bezoekers

Omdat Rottumerplaat onderdeel is van het Natura2000 gebied 'Waddenzee' en onder artikel 2.45 van de Omgevingswet valt is de toegang tot het eiland zonder vergunning of noodzakelijk doel niet toegestaan. Voor alle bezoek dient vooraf een aanvraag te worden gedaan. Tijdens de vogelwachterperiode ontvingen we in totaal 36 personen op het eiland; voor onderzoek, onderhoud en privé gasten. Dit getal is inclusief bezoeken van de schippers van de Harder en enkele mensen die even bij de aflossing het eiland mochten betreden. Al deze bezoeken zijn geregistreerd. De bezoekerslijst is bekend bij Rijkswaterstaat maar niet opgenomen in dit rapport in verband met de privacy van de betrokkenen.



Dit seizoen werden ruim 100 ballonnen uit de natuur gehaald.

Blog: Bezoek.

Omdat Rottumerplaat zoveel mogelijk met rust wordt gelaten wordt het aantal mensen dat hier voet aan wal zet ook zo beperkt als mogelijk. Vogelwachters in het broedseizoen, vogeltellers tijdens springtij, vogelrings, specialisten voor bepaalde inventarisaties, onderhouds-medewerkers voor de behuizing. Sluipenderweg is het lijstje aan het eind van ieder jaar toch weer net wat langer dan dat je zou hopen. En dan is er incidenteel ook nog ruimte voor een keertje een vriend of geliefde om de 4 maanden sociale isolatie van de vogelwachters te doorbreken. Daar wordt erg naar uitgekeken, vanaf hier maar zeker ook vanaf de vaste wal.

Drie dagen is kort om het hele eiland te ervaren maar vanaf het hoogste punt van de stuifdijk krijg je wel een goede indruk van wat er te beleven valt. Omdat de kans groot is dat jij bij de meerderheid hoort die het zal moeten doen met wat foto's en deze blog doe ik een poging om je mee te nemen naar wat er dan te zien valt. Allereerst moeten we een kilometertje wandelen over de stuifdijk. Eerst door het doolhof van ligusterstruiken en duindoorns, daarna over het uitgesleten paadje tussen de helmgraspollen. Hopelijk heeft het niet geregend die dag, want anders is je kleding nu al tot op de draad nat. We waaien wel weer droog straks. De aangelegde stuifdijk was zo'n 6 meter hoog maar wind en zand wisten hier een aardige hoogte te bereiken de afgelopen decennia. Op het hoogste punt toornt het smalle pad zo'n 18 meter boven de plaat uit.


Als we terugkijken zien we het punt waar de rubberboot aanlegde en je, in lieslaarzen gehuld, de zee in stapte. Vlak daarbij de behuizing van de dijkwerkers die hier tot begin jaren '80 werkzaam waren en waar de vogelwachters nu verblijven. En uiteraard de vogelkijktoren, waar we eerder al uren hebben staan staren naar het langzaam droogvallende wad en de vele steltlopers die daar kwamen eten. Als we het zicht een stukje naar rechts draaien, richting het zuiden, in de verte de Groninger kust. Dichterbij de Boschplaat, een eindeloze zandplaat vol vogels tijdens laagwater, langzaam kleiner wordend tijdens vloed. Helemaal verdwenen tijdens springtij. Die rand lage duintjes daar vormt de rand van Rottumerplaat. Daar broeden vele honderden meeuwen, maar dat merk je morgen

wel als we er langs lopen. En vandaar tot aan de stuifdijk is de kwelder. Nu helemaal paars, omdat de lamsoor bloeit. Zie je de smalle slenken? Die zijn straks weer tot (of over) de rand gevuld. Meer naar rechts, die witte streep, dat is de lepelaarskolonie. Er zaten dit jaar 83 broedpaar en er zijn zo'n 60 jongen groot geworden, maar we moeten nog een laatste keer die kant op om te tellen. Wellicht kunnen we dat morgen ook gelijk even doen.

Nog verder naar rechts draaiend de zuidwester duinen, met de prachtige schelpenstrandjes waar de strandplevier dit jaar weer eens een nestje jongen heeft groot gekregen. Daarachter zie je trouwens Schiermonnikoog liggen. Weer een beetje verder draaiend naar rechts zie je de volledige lengte van de rest van de stuifdijk. Nog zo'n tweeënhalve kilometer vanaf hier. Dat waren er ooit drie maar de winterstormen nemen er bijna ieder jaar weer een stevige hap uit. Dat zand verdwijnt overigens niet maar vormt verderop nieuwe duintjes. De stuifdijk is de enige plek waar de begroeiing wat hoger wordt. Er staan inmiddels serieuze bomen en stuiken, hetgeen ook verklaart dat er hier langzaam steeds meer verschillende soorten vogels broeden.

Aan de noordzijde was net na de aanleg van de stuifdijk meteen het Noordzeestrand, dus alles wat je daar ziet is er spontaan bijgegroeid. De hoge duinen van het Noordrif, de kwelders daarachter, de steeds verder naar het oosten gegroeide zandbanken die de Binnenzee omarmen. En daarna ook de Nieuwe Binnenzee. En als we ons niet vergissen zien we al weer een nieuwere binnenzee ontstaan, daar, bij het Noordelijkste puntje van Nederland. Zelf vind ik dit het spannendste stukje van Rottumerplaat. Het komt, door de wind aangevoerde zand, steeds wat hoger te liggen. Prachtige duinvorming die er een week later weer helemaal anders uitziet. Voorzichtige eerste begroeiing en sinds dit jaar ook nestjes van dwergstern, visdief en scholekster. Helaas nog weerloos tegen het allerhoogste tij, maar ook hen zal de komende jaren wellicht een beter lot gegund zijn. We kunnen zondag wel even die kant op, maar dan moeten we op de terugweg wel enorm omlopen. Of door de geul, als we op tijd zijn, het water tot net boven de knie.

Deze blog verscheen augustus 2025
op de website www.waddenzeel.nl
foto: M. van der Zwaag



4. (Sociale) Media

Omdat het gebied afgesloten is, en er wel behoefte is om iets van het gebied mee te krijgen, wordt via (sociale) media informatie gedeeld over het gebied.

4.1 Vogelwachtersblog

Maandelijks werd een vogelwachtersblog dat werd gepubliceerd op de website: waddenzee.nl

Mei 2025: 'De film is begonnen!'

Juni 2025: 'Op het randje'

Juli 2025: 'Dat had echt niet hoeven'

Augustus 2025: 'Bezoek'



Blog Rottumerplaat: de film is begonnen!

Een broedseizoen lang op Rottumerplaat mogen verblijven is voor mij iets nieuws.

7 mei 2025 | Natuur en Landschap



Blog Rottumerplaat: Op het randje

Tot de jaren '50 van de vorige eeuw was Rottumerplaat niet meer dan een kale zandplaat, westelijk gelegen van het eiland Rottumeroog.

17 juni 2025



Blog Rottumerplaat: Dat had echt niet hoeven!

Op de dag dat ik deze blog ga voorbereiden, loop ik de romneyloods in en begin te tellen en te turven.

8 juli 2025

Onze blog van augustus: **Bezoek** las u reeds op de vorige pagina van dit verslag.

4.2 Media: RTV Noord en radio NPO1

Op de voorlaatste dag van het seizoen was er een journaliste en een cameraman van RTV Noord aanwezig om Rottumerplaat te zien en van de vogelwachter te horen hoe het seizoen verlopen is. Uitzending op RTV Noord en NOS regio. Een uitgebreider verslag op de [website van RTV Noord](#).

Na afloop terugkeer op de vaste wal waren we te gast bij [NPO1 Nieuwsweekend](#) van omroep MAX.

4.3 Instagram: @rottumerplaatje

Dagelijks wordt er op instagram een plaatje gedeeld van Rottumerplaat. We proberen het eiland op verschillende manieren te laten zien: vogels, plantjes, andere beestjes, landschapjes, heel soms aandacht voor het werk van de vogelwachters.

Bereik:



April: 4000 volgers, 53.000 weergaven

Mei: 4100 volgers, 91.000 weergaven

Juni: 4200 volgers, 44.000 weergaven

Juli: 4200 volgers, 40.000 weergaven

In totaal zo'n 240.000 weergaven van de account [@rottumerplaatje](#) tijdens het vogelwachterseizoen.



5 Vogels

Hoofdmoot van de aandacht op Rottumerplaat gaat naar de vogels. Deze maken gebruik van het eiland om te rusten, broeden of te foerageren. Daarnaast trekken er met name in het voor- en najaar vogels langs en over Rottumerplaat op weg naar en van hun broedgebied elders, hier hebben wij maar beperkt aandacht aan geschonken. Veel tijd ging zitten in de broedvogelinventarisatie, hoogwatervluchtplaatstellingen, ringaflezen en bepaling van nest- en broedsucces van een aantal specifieke soorten. In de Avifauna bespreken we alle waargenomen soorten, daarna komen in aparte hoofdstukken de broedvogels en hoogwatervluchtplaatstellingen aan bod.

5.1 Avifauna

In de periode 3 april – 8 augustus werden er in totaal 149 (onder)soorten vogels vastgesteld. Al deze soorten worden hieronder besproken. De vogels die óók op Rottumerplaat broeden, worden in het hoofdstuk ‘broedvogels’ nogmaals besproken, maar dan specifiek op de monitorgegevens en broedresultaten. De volgorde besproken vogelsoorten is gebaseerd op de gangbare volgorde in de huidige vogelgidsen.

Natura 2000-instandhoudingsdoelstelling

De soorten met een instandhoudingsdoelstelling voor de Waddenzee of de Noordzeekustzone benoemen wij in groene letters: **Natura 2000-doelsoort**. Alle Natura 2000-soorten, die op de ‘broedvogellijst’ staan (13), zijn dit seizoen gezien op Rottumerplaat. 9 Broedden er ook daadwerkelijk, 4 niet. Van de Natura 2000-soorten van de ‘niet-broedende vogellijst’ (39) zijn er tijdens het seizoen 33 gezien. Van deze 33 zijn er overigens 10 óók broedvogel Rottumerplaat.

Tijdslijn

Tijdens het seizoen is er vier keer per maand een ‘weekoverzicht’ gemaakt van waargenomen vogelsoorten. Elk hieronder beschreven soort begint met een tijdslijn die laat zien wanneer de soort in 2025 op Rottumerplaat is waargenomen.

Kleur van de gekleurde vakken in de tijdslijn geeft het volgende aan:

	Broedvogel op Rottumerplaat ‘25
	Niet-broedvogel op Rottumerplaat ‘25
	Schaars/zeldzaam op Rottumerplaat
	Dood exemplaar aangetroffen

De broedvogels worden wat betreft het aantal broedparen en eventueel broedsucces nader uitgewerkt in het hoofdstuk ‘broedresultaten’. Of een soort ‘schaars/zeldzaam’ is, is overgenomen uit de uitgave Fauna van Rottum (Zekhuis & de Vries 2012) en vervolgens geactualiseerd op basis van gegevens uit waarneming.nl.

Afgelezen ringen


Tijdens het seizoen zijn er van meerdere vogelsoorten pootringen afgelezen. In de AviFauna laten we met een kaartje zien waar deze beesten eerder zijn waargenomen, en op welke locatie de desbetreffende vogels zijn gering. In de bijlages staat een compleet overzicht van alle afgelezen ringcodes. In de afgelopen maanden is er intensief contact geweest met diverse ringers i.v.m. het uitzoeken van onduidelijke aflezingen, bijvoorbeeld omdat de ringen in de loop van de jaren verkleurd zijn.



Een Lepelaar met helaas (verkleurde) kleurringen.


Geen vogelgriep 2025 Rottumerplaat

In de winter '24/'25 zijn er verontrustend veel dode Brandganzen gevonden op het eiland. Tijdens de voorbereiding op het vogelwachterseizoen hebben we afgestemd over wat te doen bij mogelijke vogelgriepslachtoffers. Op één mogelijk geval van een dode Kleine Mantelmeeuw, die in een typische houding lag, hebben we dit seizoen geen vogelgriepslachtoffers op het eiland waargenomen.



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Knobbelzwaan met kleurring: *ringplek* en eerdere *afleeslocaties*.

Knobbelzwaan




Viermaal bezochten Knobbelzwanen Rottumerplaat: begin mei een groep van 12 Knobbelzwanen die over de zeereep langstrokken. Later die maand zagen we een groep van 11 Knobbelzwanen uitrusten in de Nieuwe Binnensee. Op 2 juli een paartje met één jong, zwemmend in de Westgeul, een week later 2 exemplaren op het Oostwad.



Knobbelzwanen, de rechter draagt een kleurring

Kolgans



De Kolgans is een echte wintergast in Nederland. Op Rottumerplaat wordt de Kolgans voornamelijk door- en langstrekkend waargenomen. Begin april waren ze al doorgetrokken richting hun broedgebieden. Wij vonden op 5 april een dood exemplaar.

Grauwe gans

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren



De Grauwe Gans broedt sinds 2005 op Rottumerplaat en neemt sindsdien sterkt in aantal toe. De ganzen broeden vroeg in het seizoen, waarbij de nesten vaak hoog liggen op lage duinen en daar verscholen zijn in helmpollen en andere opgaande vegetatie. Ook kiezen ze voor de velden met russen: op de pollen daarvan maken ze hun nest. Toen het seizoen op 3 april startte, zaten de Grauwe Ganzen al op hun eieren. De eerste klus was dit jaar het tellen van het aantal nesten. Het getelde eier-gemiddelde per nest lag op 5-6 april op 5,21 eieren per nest.

Op 5 april zagen we de eerste 3 pullen uit het ei, op 8 april zagen we de eerste pullen buiten hun nest lopen. In totaal tellen we tegen de 300 nesten.

Het overgrote deel van de Grauwe Ganzen pullen haalt het niet: dit zal deels te maken hebben met het gebrek aan gras op het eiland, maar ook de grote hoeveelheid roofvogels op het eiland is de jonge ganzen fataal. Er is ook een aantal Grauwe Gans ouders die er voor kiest met hun kroost van het eiland weg te zwemmen. Zie de blog uit 2021 van vorige vogelwachters, elders in dit verslag.




Grauwe Gans op het nest

In de loop van mei 10-20 grotere pullen gezien over het hele eiland.

Eind april en in mei werden steeds minder Grauwe Ganzen op het eiland gezien. Ook werden Grauwe Ganzen, soms vergezeld door Brandganzen, overtrekkend waargenomen. Tijdens de ruiperiode in juni zijn op Rottumerplaat nauwelijks Grauwe Ganzen gezien.


In juli worden kleine groepjes Grauwe Ganzen waargenomen.

Parkgans



Tijdens de trekperiode zagen we in groepen Grauwe Ganzen en Brandganzen ook een paar keer een Parkgans ('Soepgans') mee overtrekken.

Kleine Canadese Gans




Voor het derde jaar op rij een waarneming van Kleine Canadese Ganzen. Een groepje van 4 zwom in de Oostgeul.



Kleine Canadese Ganzen in de Oostgeul

Grote Canadese Gans



Eén Grote Canadese Gans heeft op Rottumerplaat gebroed en jongen voortgebracht; het betreft een gemengd paartje met een Grauwe Gans. We hebben hen ook met hun pullen zien rondlopen.

Vanaf medio mei verschijnen er dagelijks grote groepen Grote Canadese Ganzen boven het eiland: deze zijn op trek gaan om te gaan ruien. Dat ruien doen ze aan de Oostzee bij Denemarken en Oostelijk Duitsland. Deze groepen kwamen soms ook even op de kwelder rusten en foerageren.

Brandgans

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren



Het seizoen begon met een mededeling in waarneming.nl dat er meer dan 100 dode Brandganzen werden gevonden op het eiland. Vogelgriepslachtoffers? De stoffelijke overschotten werden veelvuldig gezien, maar


ganzen die ziekteverschijnselen vertoonden gelukkig niet.

In april werden flinke groepen Brandganzen gezien op het eiland. Ze werden in groepen gezien, maar ook stonden deze ganzen gepaard. Eind april en begin mei was de trektijd: dagelijks werden er meerdere groepen overtrekkende Brandganzen gezien: alle groepen vlogen richting noordoost. De meeste van de ganzen die we in april hadden waargenomen gingen mee op trek.

Voor het tweede jaar op rij broedt de Brandgans op Rottumerplaat. Op 10 mei werd een nest met 4 eieren gevonden. Later werden twee keer een Brandgans met pullen gezien (2 en 6 pullen).



Brandgans



Ringplek van de dit seizoen op Rottumerplaat dood gevonden geringde Brandgans.

Rotgans

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren



De Rotgans is een wintergast in Nederland, die pas heel laat naar de zeer noordelijke broedgebieden wegtrekt.

Tot eind mei waren er rond de 400-500

Rotganzen op het eiland. Verspreid over de Noordkwelder en Zuidkwelder tijdens hoog water, en op het wad en langs de geulen tijdens laag water.

Op 31 mei / 1 juni zijn de Rotganzen vertrokken.

Dat gebeurde 's nachts, we hebben overdag geen overtrekkende groepen Rotganzen waargenomen.


In juni en begin juli bleken er nog enkele losse Rotganzen achtergebleven.



Rotgans

Bergeend

Natura 2000-doelsoort Waddenzee en Noordzeekustzone: rust en foerageren



De Bergeend broedt op Rottumerplaat en is gedurende het gehele seizoen op het hele eiland gezien. In april werden tijdens de HVP-telling 232 Bgeteld. De Bergeenden stonden in april in groepen of stonden als koppels bij elkaar. Later in het broedseizoen werden er geen groepen meer gezien; je zag dan koppels of individuen. Van deze laatste is de aanname dat de partner in een verlaten konijnenhol zit te broeden.

Bij diverse hopen zijn veertjes en pootafdrukken bij de ingang aangetroffen. Na het broedseizoen, vanaf half juni, gingen de Bergeenden weer groepen vormen en werden de groepen ook steeds groter. Tijdens de HVP-telling van 29 juni werden er 606 beesten geteld. Twee keer zijn er jongen gezien: op 20 mei werd er een vrouwtje met 2 pullen in een geultje in de laagkwelder gezien. Op 21 juni werd er een paartje Bergeend met 5 pullen gezien in de Westgeul.



Vrouwtje Bergeend

Nijlgans



De Nijlgans heeft in 2025 waarschijnlijk niet gebroed op Rottumerplaat. Er waren meerdere koppels (5) aanwezig op het eiland. Er zijn echter geen nesten en ook geen pullen gezien. Na het broedseizoen was de Nijlgans, in koppeltjes, soms in kleine groepjes, over het hele eiland te vinden en ook altijd goed te horen.



Nijlgans

Wilde Eend

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren



De Wilde Eend broedt op Rottumerplaat, in 2025 met 12 broedparen. De eerste drie maanden waren Wilde Eenden volop aanwezig in het gebied. We zagen ze bijna dagelijks en vonden ook een nest. Dit nest bleek een week later gepredeerd.

In de broedfase zagen we meerdere woorden van de Wilde Eend langs de Westgeul. Zou dit net als bij de Eider-telmethodek zo werken dat de 'ontbrekende vrouwtjes' op het nest zitten? Vanaf eind juni zagen we ook weer meer vrouwtjes op het wad, en mannen die ruiden richting eclipskleed.

Krakeend


Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren



Slechts één keer hebben de Krakeend waargenomen dit seizoen: in mei zat er een paartje in een kreek in de Zuidkwelder.

Pijlstaart

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren




Pijlstaarten bezoeken gedurende de winter grote wateren, waaronder het Waddengebied. Op Rottumerplaat broedden ze dit jaar niet. Begin april zagen we tientallen koppels, vooral in de West- en Oostgeul, maar ook in de plassen op de kwelders en in de Binnenzee. Begin april zagen we zo'n 200 Pijlstaarten bij de Noordplas. In de weken erna zagen we vooral veel Pijlstaarten op het wad bij de nieuwe Oostpunt en de beginnende slenken. Eind april zijn de Pijlstaarten vertrokken.



Paartje Pijlstaart

Slobeend

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren



In de winterperiode verblijven er Slobeenden op het eiland. Er werden er in de eerste weken meermaals groepjes gezien; meestal rond de 10 exemplaren die bij de Noordplas of op plassen in de Zuidkwelder foerageerden. De meeste van deze beesten trokken in de loop van april weg. Eén paartje bleef op het eiland hangen. Op basis van onze teldata tellen we 2 broedparen dit jaar. In juni was er weer een toename van het aantal Slobeenden. Ook werd het mannetje in eclipskleed gezien.

Smient

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren




De Smient is op Rottumerplaat een talrijke doortrekker en wintergast. De eerste weken van april werden op meerdere dagen enkele exemplaren gezien, met een maximum van 18 exemplaren. Eind april trokken de laatste Smienten door.

In juni werd tweemaal een mannetje gezien in de Binnenzee.

Wintertaling

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren



In april werden groepen tot 40 Wintertalingen op de kwelders waargenomen.

De Wintertalingen zitten daar vaak op de plasjes, en ook is de Binnenzee een locatie waar ze gezien worden. Zo af en toe zijn ze ook langs de Westgeul op het wad te vinden.

Na de eerste week van mei, als de talingen zijn weggetrokken, doen we éénmaal een opmerkelijke waarneming: een mannetje vliegt op uit een zijslenkje in de Zuidkwelder. Deze waarneming zou kunnen duiden op een broedgeval, maar we hebben daar geen vervolgwarnemingen meer gedaan.



Paartje Wintertaling

Eider

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee

Natura 2000-doelsoort Noordzeekustzone: foerageren



De Eider broedt in grote getalen op Rottumerplaat, in 2025 werden er 133-563 broedparen vastgesteld. Op 4 april werd het eerste nest gevonden. Op 8 april vinden we het eerste 5-ei nest. Het laatste vrouwtje dat op een nest werd aangetroffen was op 24 juni.

Tijdens de eerste HVP-telling op 19 april werden er ongeveer 1200 Eiders geteld, 2 weken later 1700. In april en mei 'verdwenen' de vrouwtjes om te nestelen. Tijdens de eidertelling nam het percentage vrouw af van 31% op 10 april naar 21% op 30 april. Vervolgens na de broedfase steeg het naar 50% op 12 mei. De vrouwtjes die in april en begin mei niet op een nest zaten, werden vooral in de Oost- en Westgeul belaagd door vaak tientallen mannetjes die hun baltsroep lieten horen.


Op 6 mei werden de eerste vrouwtjes met pullen waargenomen. In een week tijd piekte het aantal pullen in een zogenaamde Eider-crèche naar 198 pullen die op één dag werden waargenomen. Veel pullen werden tijdens de tocht van het nest naar de geul, of in de Oost- en Westgeul gepredeerd door Grote Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen. Op 22 mei werden de laatste 3 pullen gezien. Alle waargenomen pullen waren klein; maximaal 10 dagen oud. Er zijn geen pullen gezien die het tot een volwassen formaat hebben geschopt. Opvallend is ook dat we tot ruim een maand na deze datum Eidervrouwtjes op nesten eieren hebben waargenomen, maar we geen enkele pul daarvan hebben gezien. Uit de informele informatie die wij ontvingen van Rottumeroog, Schiermonnikoog en Terschelling, bleek daar een zelfde beeld: het was een slecht Eider-jaar. Na de broedfase begon de rui-fase voor de adulten: de mannetjes deden dat massaal op de Oostpunten, de vrouwtjes werden juist op de washovers aan de westzijde van het eiland waargenomen. Bijzonder om te zien in welk tempo de mooie witte Eidermannen veranderen in 'stordig bruine' Eiders; hun eclipskleed.



Eidervrouw wordt belaagd door mannen

Zwarte Zee-eend


Natura 2000-doelsoort Noordzeekustzone: foerageren



Zwarte Zee-eenden verblijven in de winter in grote groepen voor de Nederlandse (wadden)kust. Broeden doen ze hier niet; dat doen ze in Scandinavië en Rusland. Er werden meerdere keren kenmerkende 'slierten' boven zee gezien: laag vliegende groepen Zee-eenden. Ook werden er in april Zee-eenden in de Nieuwe Binnenzee gezien: ze waren daar naar voedsel aan het duiken. Vanaf medio juli zagen we dit beeld weer terug: sliertjes boven zee langs, maar ook weer Zee-eenden in de Nieuwe Binnenzee.

Middelste Zaagbek

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren



In het begin van het seizoen zagen we een groep van 4 Middelste Zaagbekken gezien; een groepje dat over zee langs het eiland vloog.

Eind juni zaten er 2 exemplaren foeragerend op het wad bij de Oostgeul.


Roodkeelduiker

Natura 2000-doelsoort Noordzeekustzone: foergeren




Op 3 mei werd er een dode, aangespoelde, Roodkeelduiker gevonden op het Noordzeestrand.

Dodaars




Op 3 april, onze aankomstdag, zagen we een Dodaars duiken in de Westgeul bij puindam 9.

Noordse Stormvogel



Op twee momenten werd er een dood exemplaar op het strand gevonden.

Jan-van-gent



Sporadisch hebben we een Jan-van-Gent over zee voorbij zien vliegen. Allen sub-adulte vogels; de volwassenen verblijven in het voorjaar aan de andere kant van de Noordzee in de broedgebieden.

Er is dit jaar niet actief zeevogels geteld, anders hadden we vast meer 'Jannen' die het eiland voorbij vlogen kunnen melden.

Ook werden er 3 dode exemplaren op het strand gevonden, waarvan de laatste met zijn snavel vast zat aan een stuk touw.

Aalscholver

Natura 2000-doelsoort *Waddenzee en Noordzeekustzone:*
rust en foerageren



Aalscholvers broeden op Zuiderduin. Op Rottumerplaat broeden ze niet. Het hele seizoen door zijn er Aalscholvers waargenomen. Meeste beesten werden gezien langs de stranden en op de Nieuwe Oostpunt. Ook werden er regelmatig kleine groepjes gezien die over het eiland vlogen.



Aalscholvers op het strand

Kleine Zilverreiger




Meerder malen zagen we een Kleine Zilverreiger op Rottumerplaat. Steeds vissend in een van de geulen.

Bij de eerste waarneming in april liep de reiger mee met een groep van 11 Lepelaars.

De Kleine Zilverreiger broedde in 2025 op Rottumeroog. In de laatste week kwamen er tot maximaal 4 exemplaren van daar foerageren op Rottumerplaat.

Grote Zilverreiger




De Grote Zilverreiger is een doortrekker op Rottumerplaat. In het voorjaar is hij schaars, in het najaar worden veel meer Grote Zilverreigers gezien.

We zagen in onze eerste week een Grote Zilverreiger in de Westgeul.



Jonge Lepelaar op het nest

Blauwe Reiger



Tijdens de voorstrek hebben we twee keer een Blauwe Reiger richting Oost over het eiland zien vliegen. Eenmaal zagen we een Blauwe Reiger aan de grond: dat was tijdens een HVP-telling op het Zuidwesterstrand. Daarna nog waarnemingen in de buurt van de Westgeul en 2 exemplaren bij de Binnenzee.

De Blauwe Reiger broedt niet op Rottumerplaat.

Lepelaar

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren



De Lepelaar was tijdens de hele periode aanwezig op Rottumerplaat.

Op de Zuidkwelder bevond zich bij aankomst al een Lepelaarskolonie. We schatten de kolonie destijds op 80 beesten.

Bij de eerste telling van de nesten begin mei, bleken er zo'n 58 nesten te zijn; de kolonie was blijkbaar toch wat groter.

Op 14 mei telden we nogmaals omdat er een vraag van werkgroep Lepelaar was om de eieren te lotteren en vonden we 63 bezette nesten, waar ook al de eerste Lepelaarkuikens uit het ei waren. Die dag werden er 85 eieren en 91 jongen geteld in de kolonie. Hierover wordt in het hoofdstuk over de broedvogels uitgebreid gerapporteerd.

Een aantal Lepelaars foerageerde dagelijks in de Oostgeul en in de Westgeul: 2x per dag, als het water de juiste hoogte had in de geulen, liepen groepjes (4-20) Lepelaars al lepelend door de geulen heen. Op basis van steeds dezelfde ringen die we aflezen, lijkt het erop dat we regelmatig naar dezelfde vogels zaten te kijken. Begin juli voegen zich daar regelmatig juveniele beesten bij en groeit de groep tot uiteindelijk 70 exemplaren.

Begin juni werden er een paar nesten buiten de kolonie gevonden: er ontstonden uiteindelijk twee nieuwe, kleine kolonies die zich ter hoogte van vlinderpaal 19 en 20 in de kwelder bevonden.

Ring en zenderen


Op 11-12 juni waren Petra de Goeij (Rijksuniversiteit Groningen) en haar team (onderzoekers van RUG en NIOZ en vrijwilligers van werkgroep Lepelaar) aanwezig om Lepelaars te ringen. Er zijn die dag 18 jonge Lepelaars geringd. Vier daarvan zijn ook gezenderd. Via de website <https://maps.nioz.nl/spoonbills-NL/> (zoek 'spoonbills') kun je de Lepelaars 'Borkum'(NHDA), 'Rebel'(NHXR), 'Lauwers'(NH6T) en 'Kria'(NHJ2) live volgen.



Gezenderde en geringde jonge Lepelaar 'Borkum'



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Lepelaars met kleurring:
ringplek en eerdere afleeslocaties Nederland.



3 juli: eerste gezenderde Lepelaar ('Kria') verlaat Rottumerplaat.



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Lepelaars met kleurring:
ringplek en eerdere afleeslocaties internationaal.

Zeearend




Als een Zeearend over Rottumerplaat vliegt, gaan alle vogels van het eiland de lucht in. Deze sensatie hebben we dit seizoen veelvuldig mogen aanschouwen. Op in totaal 25 dagen zagen we 31 keer een Zeearend over het eiland komen.

De Zeearend voelt zich meer thuis in Nederland. Zo'n twintig jaar geleden broedde de Zeearend voor het eerst in ons land. Inmiddels broeden er meer dan 35 paar in Nederland. Het toenemende aantal vogels in (Noord-) Nederland is ook terug te zien in het aantal waarnemingen op Rottumerplaat door de jaren heen.




Zeearend op de Oostplaat



Zeearend op Rottumerplaat door de jaren heen

Visarend



Eenmaal zagen we een glimp van deze langstreckende roofvogel: vanaf de telpost zagen we door de telescoop hoe heel de meeuwenkolonie op het Noordrif de lucht in ging voor een overtrekkende Visarend.

Bruine Kiekendief

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee



De Bruine Kiekendief is een vaste broedvogel van Rottumerplaat. Dit jaar werd er een recordaantal van 8 bezette nesten geteld.

In de eerste weken van het seizoen was nog niet duidelijk welke Bruine Kieken aan het doortrekken waren, en welke van plan waren op Rottumerplaat te blijven nestelen. Gaandeweg de weken namen we regelmatig balts waar, en vielen er specifieke plekken op waar we vaak Kiekendieven zagen.

In de loop van mei werd vanzelf duidelijk waar de nesten zich bevonden: eerst waren er een aantal plekken waar een vrouwtje wel erg laat opvloog. Begin juni was de combinatie van een opvliegend vrouwtje, mét hoge piepgeluiden uit het struikgewas, de makkelijke code om te kraken. Bij gebrek aan muizen, deze zijn niet op Rottumerplaat aanwezig, voeden de Kiekendieven zich met kuikens en konijnen.



Drie Bruine Kiekendiefkuikens en een konijn als prooi.

Blauwe Kiekendief

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee



Blauwe Kiekendieven komen tijdens de trektijd langs Rottumerplaat. Soms blijven ze een dagje plakken en jagen ze langs de stuifdijk. Meeste Blauwe Kieken die gezien zijn, trokken over de Noordkwelder richting Noordoost.

Buizerd




De Buizerd broedt langs de stuifdijk in vlierstruiken. Er zijn dit jaar 2 horsten. De vier adulte Buizerds werden regelmatig gezien; soms vlogen ze van het nest af, soms zweefden ze hoog in de lucht boven het eiland.



Twee Buizerdkuikens op hun horst.

Ruigpootbuizerd




In de eerste twee weken van het vogelwachersseizoen werd de Ruigpootbuizerd 4 keer waargenomen. Ruigpootbuizerds overwinteren in ons land.

Wespendief




Op 2 juni kwam er een Wespendief over het eiland; laag over de kwelder zwevend, kreeg hij het er flink van langs van de meeuwen uit de kolonie.

Sperwer



Tijdens de voorjaarsstrek zijn meerdere Sperwers waargenomen op het eiland. In de eerste weken zagen we bijna dagelijks een Sperwer langstrekken. Ze deden dat soms al jagend langs de stuifdijk en tussen de struiken door. Vanaf half juli zien we weer Sperwers jagend boven/langs het eiland verschijnen.


Havik



Op 26 april zag één van de vogelwachters vanuit de hangmat een Havik langs schieten.

Eind juni en eerste dagen juli wordt een vrouwtje Havik meerdere dagen jagend op het eiland gezien. Later in juli zien we weer een Havik jagen boven de stuifdijk.

Torenvalk



De Torenvalk is alleen als langstreckende soort waargenomen. Logisch: er zijn op het eiland geen muizen en dat is de favoriete prooi. Op 12 april kwamen er in een middag ongeveer 15 Torenvalken langs vliegen: vanaf de telpost goed te zien; laag over de Noordkwelder richting Noordoost.

In juli kwam de Torenvalk richting west over het eiland, en één werd jagend waargenomen boven de Oostkwelder.

Slechtvalk

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren



Vanaf het begin van het seizoen zien we bijna dagelijks 2 paartjes Slechtvalk op het eiland. Eén aan de Zuidwest kant van het eiland, één op de Noordkant van het eiland. Beide paartjes zien we steeds in dezelfde hoek van het eiland. Wanneer we tijdens BMP-wandelingen in de buurt van een mogelijke nestlocatie lopen, worden we vanuit de lucht in de gaten gehouden.


Daar stopt het spannende verhaal: er is geen alarmerend gedrag waargenomen, er zijn geen nesten/eieren gevonden, geen jongen gezien.

De waarnemingen worden in mei minder frequent (wat we in eerste instantie duiden als:

zou er één op een nest zitten?), maar we blijven beide paren geregeld tegenkomen.


Het paartje aan de zuidkant zien we in de loop van het seizoen verkassen naar het Zuidwester Strand. Ook daar hebben we, tevergeefs, gezocht naar een nestlocatie.

Smelleken



De Smelleken is een trekvogel die in het voorjaar langs de kust naar het noorden trekt. Gedurende de eerste weken werden in totaal 5 keer Smellekens gezien, soms meerdere op een dag.

Waterral




Deze raadselachtige broedvogel heeft ook dit jaar weer op Rottumerplaat gebroed. In de voorjaarstrek zijn meerdere keren Waterrallen gehoord. Bij het Middenbos en bij de behuizing was er vaker een Waterral te horen. De Waterral bij de behuizing is helaas overleden; we vonden deze vlakbij het huis.

De Waterral die zijn territorium bij het Middenbos had, is nog meerdere keren in het seizoen gehoord. In de laatste week kwam een exemplaar, waarschijnlijk al weer op trek richting het zuiden, buurten bij de behuizing.



Dode Waterral dd 30-4

Meerkoet



Op 30 april werd er een Meerkooit waargenomen in de Noorderplas. Er is die middag eigenlijk weinig aandacht besteed aan deze waarneming: er stonden geringde Lepelaars naast; daar was de focus op.

Bij het nazoeken van eerdere waarnemingen, bleek een levende Meerkoet, overdag zien op Rottumerplaat, een grote zeldzaamheid te zijn! Dit was de 13^e waarneming van een Meerkoet van de laatste 20 jaar van een levende Meerkoet op Rottumerplaat

De volgende dag is nog een speciale tocht gemaakt naar de Noorderplas om de Meerkoe te fotograferen. Helaas was hij al weer doorgetrokken.



Scholeksters

In het begin van het seizoen was er dagelijks een zgn ‘soos’ van zo’n 80 Scholeksters die bij de overgang bij de behuizing stond. Deze groep wordt gevormd door Scholeksters die een territorium hebben nabij de behuizing. In de loop van april zagen we deze soos steeds kleiner worden, en zagen we (geringde) beesten terug langs kwelders van de Oostgeul, Westgeul en op de puindammen om te broeden. Op 8 mei vonden we het eerste Scholekster-ei. Over de broedende Scholekster meer info bij het overzicht van de broedvogels.

In juli werd de HVP bij de Oostgeul steeds groter, en zagen we steeds meer beesten die op de vaste wal geringd waren.

Op Rottumerplaat wordt al jaren onderzoek gedaan naar Scholeksters in het kader van het zogenaamde CHIRP-onderzoek (Cumulativ Human Impact on biRd Populations). Ook dit jaar zijn er twee weekenden vogelringers op het eiland geweest om Scholeksters te ringen en de populatie te observeren. De vogelwachters ondersteunen dit onderzoek d.m.v. het aflezen van ringen, het zoeken en volgen van nesten. Deze informatie wordt in nestkaarten in AVInest verzameld.

Meer informatie over dit onderzoek is te lezen op de website <https://www.chirpscholekster.nl/> en <https://www.scholekster.org/>

Interessante ring-aflezingsen waren 2 Scholeksters die in 1996 en 1997 op Schiermonnikoog geringd zijn.

Scholekster

Natura 2000-doelsoort Noordzeekustzone en Waddenzee:
rust en foerageren



De Scholeksters zijn tijdens het hele vogelwachterseizoen op nagenoeg het gehele eiland gezien. In april werden er bij een HVP-telling zo'n 900 Scholeksters geteld.

Scholeksters hebben in 2025 over nagenoeg het hele eiland gebroed.

Dagelijks was er het gehele seizoen een groep Scholeksters op het wad, die tijdens hoogwater langs de Oostgeul hun HVP-plek hadden. Dit waren niet broedende beesten, die in de loop van het seizoen werden aangevuld met Scholeksters die klaar waren met broeden; van zowel het eiland als ook de vaste wal (op basis van kleurringen).

Er zijn veel kleurringen afgelezen: deze vertellen dat er een vaste groep Scholeksters rond de behuizing verblijft: ze zijn hier geringd en worden door de jaren heen alleen op deze plek afgelezen. Scholeksters die op de vaste wal broeden, komen na het broedseizoen naar het wad.



De Scholekster die in 1997 op Schiermonnikoog geringd is; minstens 28 jaar oud!



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Scholeksters met kleurring: **ringplek** en **eerdere afleeslocaties**.



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Scholeksters met kleurring: **ringplek** en eerdere **afleeslocaties** ingezoomd op Noord Nederland

Kluut

Natura 2000-doelsoort Noordzeekustzone en Waddenzee: rust en foerageren



Tijdens de voorjaarsstrek is maar één Kluut waargenomen. In juni werd tijdens een HVP-telling een tweetal Kluten gezien in de Nieuwe Binnenzee, begin juli werd er daar nogmaals één gezien, en later een groepje van vijf.

Bontbekplevier

Natura 2000-doelsoort broedvogel Noordzeekustzone en Waddenzee



Bontbekplevieren werden gedurende het hele seizoen waargenomen. In het begin en eind als doortrekker, daar tussenin als broedvogel. In het begin van de voorjaarsstrek zien we relatief kleine groepjes langskomen. Begin juni, als bijna alle andere soorten al doorgetrokken zijn, zien we grote groepen van wel 500. Dit zijn de iets donkerdere Bontbekken zijn die naar arctisch gebied zullen doortrekken. Nabij de behuizing, maar ook op het Zuidwesterstrand en het Noordrif werden territoria gevonden.



Bontbekplevier

Een aantal van de Bontbekken waren eerder op Rottumerplaat geringd. Zo konden we de broedparen uit elkaar houden. Bontbekken met ringen W63, W74, W75, W76 hebben broedpogingen gedaan. Daarnaast is dit voorjaar W8J geringd door sternen-ringer Derrick Hiemstra.

Later werden nog 3 juvenielen en een adult beest geringd door Bram Ubels. Zie nadere info in de bijlage met het afgelezen ring-overzicht.




Bontbekplevier in de handen van een ringer

we later 2 pulletjes van hebben waargenomen. Dit is het tweede broedgeval sinds 2017 op Rottumerplaat (ook in 2022).




Jong Strandpleviertje



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Bontbekplevieren met kleurring: **ringplek** en eerdere **afleeslocaties**.

Strandplevier

Natura 2000-doelsoort **broedvogel Noordzeekustzone en Waddenzee**



De Strandplevier is een rode-lijst-soort die op schelpenstrandjes aan de kust broedt. Dit jaar hadden we, na een doortrekkend exemplaar op de Noordoostpunt, een broedend paartje op het Zuidwesterstrand. Een nestje met 3 eieren, waar

Zilverplevier

Natura 2000-doelsoort **Noordzeekustzone en Waddenzee: rust en fourageren**



In de eerste weken van het seizoen zagen we flinke aantallen Zilverplevier. Bij onze eerste HVP-telling telden we er 550. Ook zagen we het prachtkleed van de Zilverplevier steeds vaker. In de loop van mei nam het aantal Zilverplevieren weer snel af; ze trokken richting hun broedgebieden in Siberië. Medio juli keerden de eerste Zilverplevieren terug.

Goudplevier


Natura 2000-doelsoort **Waddenzee: rust en foerageren**



De Goudplevier is veel minder op het wad te vinden dan de Zilverplevier. De Goudplevieren werden slechts enkele keren waargenomen.

Kievit

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren



Op twee dagen in dit seizoen werden er Kieviten waargenomen: op 14 juli zaten er 3 Kieviten in de kwelder langs de Westgeul te foerageren, de dag er na vloog een Kievit over de Kwelder.

Kanoet


Natura 2000-doelsoort Waddenzee en Noorzeekustzone: rust en foerageren



De Kanoeten zijn tijdens de najaarstrek in grote getalen in de Waddenzee aanwezig. In het voorjaar, zo namen wij waar, zijn de aantallen een stuk kleiner. We zagen in de loop van april het aantal Kanoeten langzaam toenemen. Eind mei, was de voorjaarsstrek al weer over het hoogtepunt heen. De waarneming op 10 juni waren niet adulte beesten die waarschijnlijk niet naar de broedgebieden zullen trekken. Half juli worden de eerste Kanoeten weer op het wad bij Rottumerplaat waargenomen. De aantallen zijn meteen al groter dan in de voorjaarsperiode en groeien tot vele duizenden begin augustus.

Drieteenstrandloper

Natura 2000-doelsoort Waddenzee en Noorzeekustzone: rust en foerageren



Pas eind april werden de Drietenen iets talrijker; in de weken ervoor werden slecht enkele exemplaren gezien. Dat bleek meteen de piek van de voorjaarsstrek. In mei werd nog wel een exemplaar in vol broedkleed gezien; dat is een stuk kleurrijkers dan het grijs-witte kleed dat in het najaar en de winter wordt gezien. Half juli zien we de eerste Drietenen weer terug op het wad.



Drieteenstrandloper in zomerkleed

Steenloper

Natura 2000-doelsoort Waddenzee en Noorzeekustzone: rust en foerageren



Aan het begin van het seizoen waren er dagelijks tientallen (tot 80 exemplaren) Steenlopers aanwezig. Vaak stonden ze op puindam 7 tijdens hoogwater, en foerageerden ze op de kwelders langs de Westgeul.

Later in de voorjaarsstrek zagen we de Steenloper in kleinere groepen (10-15) op de puindammen 2 en 3 tijdens hoogwater foerageren op het wier aldaar.



Steenlopers zitten bij hoog water op een puindam.

Begin juli zien we de eerste Steenlopers weer terug. Al snel gaat het om HVP-groepen rond de 100 exemplaren die op puindam 3 en 7

pleisteren en foerageren op de wieren, zoals achterop op puindam 2.


Later groeide de groep richting de 200 en werd een beest afgelezen dat in Guinee-Bissau is geringd.



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Steenlopers met kleurrijke ringplek en eerdere afleeslocaties.

Bonte Strandloper

Natura 2000-doelsoort Waddenzee en Noorseekustzone: rust en foerageren



De Bonte Strandloper is één van de steltlopersoorten die in grote getale in de Waddenzee aanwezig is. Ook in het voorjaar kunnen er best grote groepen te zien zijn. De Bonte Strandloper was de hele periode van voorjaars trek in relatief kleine groepen in de buurt van Rottumerplaat aanwezig. Tijdens de HVP-tellingen, altijd bij verhoogd tij, kwamen


ook alle bontjes vanaf de Boschplaat richting Rottumerplaat. Dan telden we er tot 5000 tegelijk.



Drie 'Bontjes'

Krombekstrandloper

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren




Tijdens de voorjaars trek zat er, in een groepje Bonte Strandlopers, ook één klein mooi rood steltloperje rond: de Krombekstrandloper. Eind juli, de najaars trek dus inmiddels, bracht ons een groepje van 5, langs de waterlijn bij de puindammen.



Prachtig rood van de Krombekken


Kleine Strandloper



Begin mei was de periode waarin we veel voorjaars trek van steltlopers op het wad hadden. In een groep Bonte Strandlopers, wat ook al best kleine vogeltjes zijn, stonden 2 Kleine Strandloperjes.


Eind juli stond er één Kleine Strandloper tussen een stel Bontjes langs de Westgeul.

Bosruiter



Deze Ruiter werd begin juli, bij de eerste beesten die uit het noorden terug kwamen, waargenomen in de Westgeul.

Witgat



De Witgat laat zich altijd duidelijk horen tijdens de vlucht. Zo determineerden we drie maal een doortrekkend beest tijdens de voorjaars trek. Op 13 juli zagen we 2 Witgatjes overkomen; de eerste waarneming in de najaars trek.

Oeverloper



De Oeverloper is een doortrekkende soort, die zich makkelijk laat zien. Langs de randen van de geulen foerageren ze en als ze laag over het water langs vliegen laten ze zich altijd even horen. Van eind april tot eind mei zijn er Oeverlopers waargenomen. Begin juli komen de eerste Oeverlopers weer zuidwaarts; we zagen er veel langs de waterlijn huppen.



Oeverloper

Tureluur

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren




Tureluurs waren het hele seizoen aanwezig op het eiland. Er waren flink wat broedende exemplaren, vooral op de lagere delen van de Zuidkwelder langs de kwelderkwelen. Bij de eerste HVP-telling in april werden er 224 Tureluurs geteld; dat waren veelal doortrekkende Tureluurs die een HVP langs de kwelderrand van de Westgeul hadden. Later in april verspreidden de vogels zich over het eiland en zaten er nog slechts enkele exemplaren bij de puindammen. In juni verzamelden de Tureluurs, waarvoor het broedseizoen erop zat, zich in de Werstgeul en de Grote Slenk. Eerst enkele tientallen, later verder er meer vogels geteld waaronder ook juveniele vogels. Vanaf eind juni zien we de Tureluurs ook weer meer op het wad; dit zijn terugkerende beesten.



Eieren van de Tureluur

Zwarte Ruiter

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren



Tijdens de voorjaars trek hoorden we éénmaal een Zwarte Ruiter langsvliegen. Gelukkig liet hij zich in juli wat beter bekijken; prachtig beestje.



Zwarte Ruiter, in ruikleed

Groenpootruiter

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren




De Groenpootruiter is tijdens de voorjaars trek alom aanwezig aan de wadkant van het eiland. In kleine groepen, soms tot 30, werd de Groenpootruiter waargenomen bij de Noorderplas, de Binnenzee, de Oostgeul en op het wad. Begin juli keren de eerste Groenpoten terug uit hun broedgebieden. Al snel zien we tientallen Groenpoten op het wad en langs de geulen.



Groenpootruiters in de Westgeul

Grutto

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren



Op 26 mei een leuke verrassing: 3 'gewone' Grutto's staan even te rusten langs de Oostgeul ter hoogte van de behuizing.

Rosse Grutto

Natura 2000-doelsoort Waddenzee en Noordzeekustzone: rust en foerageren




De Rosse Grutto overwintert in West-Afrika, en komt in het voorjaar in één lange trek richting de Waddenzee om nog één keer flink te bunkeren. Daarna vliegen ze door richting het Arctisch gebied om daar te broeden.

Dit was één van de eerste soorten waar de wadwachters dit jaar over leerden: tijdens zomers en najaars trek is de Rosse Grutto alom aanwezig in het waddengebied. Maar begin april nog niet. Dan zijn ze nog in Afrika. Pas eind april komen serieuze aantallen Rosse Grutto's deze kant op. Eind mei trekken de meeste Rosse Grutto's weer door. In juli wordt het met de dag drukker met terugkerende beesten: dit zal richting het najaar tot tienduizenden exemplaren oplopen.



Rosse Grutto



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Rosse Grutto's met kleurring: **ringplek** en **eerdere afleeslocaties**.



Rosse Grutto's

Wulp

Natura 2000-doelsoort Waddenzee en Noordzeekustzone: rust en foerageren



De Wulp is binnen de steltloperfamilie een vroege soort. We zien meteen in de eerste week al grote groepen Wulpen op de HVP's. Dit zijn de Wulpen die naar het Noorden trekken.


Daarnaast is er ook een gering aantal Wulpen dat op het eiland tot broeden komt (zie hoofdstuk broedvogels). Die zijn in de nestfase zo onopvallend mogelijk aanwezig, pas als er eieren en of jongen zijn, zien we veelvuldig alarmerend gedrag.

Begin juni, als sommige andere soorten nog aan het doortrekken naar het noorden zijn, komen de eerste Wulpen alweer zuidwaarts. Zij markeren het omslagpunt van voorjaars- in najaarstrek.



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Wulp met kleurring: **ringplek** en **eerdere afleeslocaties**.

Regenwulp



De Regenwulp is een onopvallende vogel. Hij is in het voorjaar veelal individueel of gepaard onopvallend aanwezig. Ze bewegen zich in het voorseizoen behoedzaam langs de puindammen en over de kwelder van de Westgeul. Zijn aanstekelijke roep verradt hem telkens weer. Eind mei trekken de Regenwulpen door naar hun broedgebieden, medio juni zien we de eerste beesten alweer terug.

In juli zijn er veel Regenwulpen aanwezig; ze laten zich nu wat beter zien: ze foerageren volop op het wad.



Regenwulp

Kokmeeuw



Heel het seizoen door zijn er Kokmeeuwen rondom het eiland. Dagelijks was er een groep van ongeveer 200 niet volwassen Kokmeeuwen die foerageert langs de slenken en uitrust op een HVP bij de puindammen te zien. Ook was er een kortstondige broedpoging van 3 paartjes Kokmeeuw.



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Kokmeeuwen met kleuringen: **ringplek** en eerdere **afleeslocaties**.

Stormmeeuw



De Stormmeeuw broedt op Rottumerplaat en is gedurende het gehele seizoen op het eiland gezien. Tijdens de eerste HVP-telling half april zijn 245 exemplaren geteld. Door het seizoen was er dagelijks een groep onvolwassen Stormmeeuwen bij de Westgeul of op de Noordkwelder gezien. Zij vormen dagelijks een HVP-groep met niet adulte Kokmeeuwen. Stormmeeuwen hebben in 2025 op één locatie gebroed: aan de Oostkant van het Noordrif, ten

Oosten van de kolonie Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen, hadden de Stormmeeuwen hun eigen kolonie van ongeveer 30 nesten. In juli nam het aantal Stormmeeuwen rond het eiland toe; ze foerageerden volop op het wad te zuiden van Rottumerplaat.



Stormmeeuw-pul



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Stormmeeuw met kleuring: **ringplek** en eerdere **afleeslocaties**.

Kleine Mantelmeeuw

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee



De Kleine Mantelmeeuw is als broedvogel alom aanwezig op het eiland. Op Rottumerplaat broedden Zilvermeeuwen in Kleine Mantelmeeuwen bij elkaar in 13 gemengde kolonies. In 2025 zijn 2649 broedpaar Kleine Mantelmeeuw berekend. Het eerste ei van een grote meeuw werd op 23 april vastgesteld. Een maand later lagen in de meeste nesten 3 eieren. In de derde week van juni liepen overal in de kolonies jonge pullen rond. De juveniele vogels stond later, vanaf de 2^e week van juli meer buiten de kolonie en ook op het strand.



Kleine mantelmeeuw




Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Kleine Mantelmeeuw met kleureringen: **ringplekken** en eerdere **afleeslocaties**.

Grote Mantelmeeuw



De Grote Mantelmeeuw broedde dit jaar weer op Rottumerplaat.


Naast het paartje volwassen meeuwen dat kwam broeden, waren er ook flink wat 2^e en 3^e jaars beesten op het eiland aanwezig. Zij fungeren als 'opruimploeg': als er kadavers liggen (zoals dode zeehonden of aangespoelde vogels) ruimen zij die op. Maar het zijn ook rovers: we hebben menig eider-pulletje zien verdwijnen in de bek van een Grote Mantelmeeuw.



Grote Mantelmeeuw, pul van ongeveer 1 week oud

Dwergstern

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee en Noordzeekustzone



De Dwergstern liet zich al in het begin van het sternenseizoen bij het eiland horen en zien. We zien baltsgedrag, paringen, en op 1 juni zelfs 3 nestkommetjes met steeds één ei erin. Helaas zien we de dag erna, sterneringen Derrick Hiemstra had het scherp in de gaten, dat de nestjes allemaal gepredeerd zijn. Daarna zien we sporadisch Dwergsterns, alleen op 9-6 lijken ze bij puindam 3 te gaan broeden. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Op 20 juni wordt er bij de Noordoostpunt een kolonie van 15 nestjes Dwergstern gevonden. Helaas is deze kolonie op 23 juni door hoogwater weggespoeld. Uiteindelijk zijn er dit seizoen dus geen Dwergsterneitjes uitgebroed op Rottumerplaat.



Dwergstern (voor) en Visdief

Grote Stern

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee



In het begin van het seizoen waren regelmatig wat Grote Sterns te zien. Groepjes van 10 tot 40 exemplaren, soms met baltsgedrag en parend. Dit zijn beesten die waarschijnlijk op Rottumeroog zijn gaan broeden. Op 10-6 komt daar verandering in: ineens staat er een grote groep van meer dan 100 grote sterns bij ons op het strand. Waarschijnlijk, en de afgelezen ringen geven daar aanwijzingen voor, zijn dit grote sterns die van een grote kolonie van Texel komen. Deze kolonie is door Grote Mantelmeeuwen gepredeerd. De sterns zijn op zoek naar een nieuwe nestlocatie. Dat wordt waarschijnlijk Rottumeroog. Sindsdien zien we meer grote sterns: zowel op de Noordoostpunt, maar ook bij de puindammen.



Grote Stern biedt visje aan partner aan

Dankzij regelmatige aanwezigheid Grote Sterns, dit jaar ook de gelegenheid om flink wat ringen af te lezen. Zo zijn er sterns hier op het eiland afgelezen die eerder ook in Namibië gezien zijn.



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Grote Sterns met kleurringen: *ringplekken* en eerdere *afleeslocaties*.

Visdief

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee



Visdieven broedden in 2025 alleen op de puindammen bij de behuizing; puindam 3 is de hoofdkolonie, een enkele Visdief week uit naar puindam 2 of 1. In totaal zijn er 105 broedparen vastgesteld. De eerste Visdieven verschenen op 11 april boven de puindammen. Op 14 april werd voor het eerst een baltsritueel vastgesteld: ene

Visdief biedt een visje aan aan de ander, daarna volgt een dansje om elkaar heen. Later leidde dit ritueel tot paringen en het gezamenlijk zoeken en claimen van een nestlocatie. Eerst waren de Visdieven een uur per dag boven de puindam aanwezig, daarna voor een paar uur op de puindam. Pas bij de definitieve eileg begin mei bleef de kolonie 24/7 bij de puindam aanwezig. Er werden destijds zo'n 50 paar Visdief geteld. In de loop van de weken kwamen daar nog wat paartjes bij, en al vrij snel moesten sommige Visdieven opnieuw beginnen i.v.m. een te laag gelegen nestlocatie.

Op 11 juni tellen we zo'n 86 nesten op puindam 3, waar op dat moment 76 eieren en 33 pullen worden geteld. 16 nesten zijn al leeg, of de pullen zijn erbij weg gelopen, of de pullen waren al gepredeerd. Verreweg de meeste pullen worden in de volgende weken door gespecialiseerde Zilvermeeuwen gepredeerd. Begin juli tellen we 5 stevige pullen op puindam 3 die tot dan toe de hoge waterstanden maar vooral de Zilvermeeuwen hebben overleefd.



Visdiefjong wordt gevoerd



Jonge Visdieven op de puindam



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Visdieven met kleuring: ringplek en eerdere afleeslocaties.

Noordse Stern

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee



Op 25 april werden de eerste Noordse Sterns signaleerd op het eiland. Ze sloten zich in eerste instantie aan bij de Visdieven die al eerder present waren. In die weken worden er steeds meer waargenomen, zien we ze visjes aan elkaar voeren, baltsdansjes en vluchten maken en ook paren.



Noordse Stern op het nest

Rond 22 mei gaan de eerste Noordse Sterns broeden. De meeste Noordse Sterns broeden op puindam 2 en op de gobi-matten tegen het eiland. Ook zaten ze bij puindam 1 en een klein groepje van 5 broedsels bevond zich op puindam 3 bij de Visdieven. In totaal waren er

destijds 78 nesten aangetroffen; meestal met 2 eieren erin, heel soms 3. Begin juni kwamen de eerste pullen uit het ei. De meeste pullen zijn in deze periode gepredeerd door Zilvermeeuwen. Dit leidde in ongeveer 20 gevallen tot een 2^e legsel.

In juni troffen we 3 Noordse Sternnesten aan bij een kolonie Dwergsterns op de nieuwe Oostpunt. Deze nesten werden een paar dagen later weggespoeld bij verhoogd tij. Begin augustus waren alle Noordse Sterns van het eiland weg.



Noordse Stern, net geringd



Herkomst van de dit seizoen op Rottumerplaat afgelezen Noordse Sterns met kleuring: ringplek en eerdere afleeslocaties. (NB: Noordse sterns bevinden zich 7 maanden per jaar op de oceanen op het zuidelijk halfrond. Daar komen geen terugmeldingen van...)

Zwarte Stern

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust




De Zwarte Stern kwam tegelijk met de andere sterns in de Waddenzee aan. De hele maand mei werden regelmatig Zwarte Sterns gezien bij het eiland. Ook mengden ze zich tussen de Visdieven en Noordse Sterns op de HVP bij de puindammen en één keer zelfs een koppeltje Zwarte Sterns op puindam 3 in de kolonie. Hier bleef het bij, vanaf juni zijn de Zwarte Sterns een tijdje niet meer gezien.

Eind juni zagen we de eerste exemplaren weer in HVPgroepen met Kokmeeuwen en Grote Sterns langs de Oostgeul. Half juli waren dat er 60 bij elkaar.




Zwarte Stern met daarvoor een Visdief en twee Grote Sterns

Witvleugelstern




Tijdens de najaarstrek zwermen sterns uit over de Waddenzee. Zo ook die ene Witvleugelstern op 15 juli die boven de Westgeul aan het jagen was.

Zeekoet



Eind april spoelt er tijdens een hoog tij een dode Zeekoet aan op de kwelder aan de Westgeul. In juli vinden we een dood exemplaar op het strand.

Alk



Op 9 april vinden we een dode Alk op het Zuidwesterstrand.

Postduif



Net als trekvogels komen er zo af en toe ook Postduiven over het eiland vliegen. Op 22-6 was er een Postduif die een nachtje heeft uitgerust bij de behuizing. Het was een tam dier. Na het aflezen van de ring hebben we de eigenaar op de hoogte gesteld. Het was een beest uit Rockanje (ZH).




Postduif

Holenduif



Op 2 plaatsen op het eiland; bij het Middenbos en in de duinvallei dichtbij de 3^e knik, zagen we regelmatig Holenduiven vliegen. Holenduiven broeden in verlaten konijnenholten.

Houtduif



De maanden april en mei is de Houtduif zeer regelmatig gezien. Zowel bij de behuizing als bij het Kraaienbos was de Houtduif aanwezig. Ondanks de regelmatige waarnemingen, ontdekken we geen nestlocatie. Daarna zien we ze een tijdje niet, pas begin juli zien we weer rond het Middenbos.

Turkse Tortel




De Turkse Tortel dook zo af en toe op rondom de behuizing, maar was ook steeds weer snel verder getrokken.



Turkse Tortel


Koekoek



Op 13 mei was er een langstrekkende Koekoek een dag lang bij de behuizing te horen. Later in het seizoen, 11 juni en op 1 juli, werd er nog een Koekoek bij het Middenbos waargenomen. Het laatst genoemde beest zien we in gezelschap van een Graspieper, waaruit we de conclusie trekken dat dit goed kan duiden op een geslaagd broedgeval


Velduil

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee



In het begin van het seizoen zagen we tweemaal een Velduil. Beide keren zat hij op de Noordkwelder en vloog hij op toen wij langsliepen. Naast deze ontmoetingen op de Oostkwelder zijn er twee dode Velduilen (wat daar van over was; voornamelijk de vleugels) op de Zuidkwelder gevonden tijdens BMP-rondes.

Hop




Daar was op 13 april, opeens, de Hop in de tuin naast de behuizing. Hij ging er even mooi voor zitten op de paal van de waslijn. Na een fotomoment, vloog hij op en was ie weg.



Hop

Grote Bonte Specht



Begin juli wordt er een Grote Bonte Specht waargenomen bij de behuizing, en er wordt later een exemplaar bij het Middenbos gezien. Het beest blijft ruim een maand bij de behuizing plakken.



Grote Bonte Specht

Gierzwaluw



Heel vogelend Nederland kent het ezelsbruggetje dat je de eerste Gierzwaluw rond Koningsdag kan zien boven je huis. Dat geldt niet voor Rottumerplaat; pas later komen de eerste Gierzwaluwen hier voorbij trekken. Op 9 mei was er op Rottumerplaat het jaarlijkse '1° Gierzwaluw-moment' te vieren; een aantal voorbij trekkende giertjes. Later in het seizoen in juni en juli, waren er dagen dat een groepje Gierzwaluwen boven het eiland op insecten aan het jagen waren.

Veldleeuwerik




De Veldleeuwerik is een veelvoorkomende broedvogel op Rottumerplaat. Dagelijks werden onze excursies vergezeld van de vrolijk makende zang van de Veldleeuwerik. Vooral op de Zuid- en de Noordkwelder waren de Veldleeuweriken talrijk aanwezig.




Witte Kwikstaart

Rouwkwikstaart




In de allereerste week van het seizoen werd een Rouwkwik waargenomen bij de dijkovergang bij de behuizing.

Gele Kwikstaart




Daar waar de Gele Kwikstaarten op Terschelling op de Boschplaat en op Schiermonnikoog op hogere kwelders broeden, is dat hier niet (meer) het geval. We zien de Gele Kwik op Rottumerplaat zowel in de voorjaars als de najaarstrek langskomen.

Engelse Kwikstaart



Op de Noordkwelder zagen we deze ondersoort van de Gele Kwikstaart.

Noordse Kwikstaart




Op 12 mei was er een flinke groep van 17 Noordse Kwikstaarten op doortrek. Ze foerageerden bij de Romneyloods voor, en waren zodoende vanuit de uitkijktoren mooi te bekijken.

Heggenmus




De Heggenmus was het hele seizoen, over heel de stuifdijk verspreid, dagelijks aanwezig. Vanaf begin april zaten er meerdere paartjes te zingen bij de behuizing, maar ook op diverse plekken langs de stuifdijk in de bosschages. De Heggenmus zingt nagenoeg het hele jaar door op Rottumerplaat.



Heggenmus op zijn zangpost

Roodborst



Al vroeg in het seizoen werd een Roodborstje met voedsel in de snavel waargenomen. Steeds bij de behuizing, in het struweel bij de appelboom, zagen we de Roodborst wegschieten.

Nachtegaal




Vanaf 20 april zat er een zingende Nachtegaal bij de behuizing. Op gegeven moment zong hij zowel dag als nacht. Op 4 mei stopte dat abrupt, op 7 mei begrepen we waarom: de Nachtegaal was te pletter gevlogen tegen een raam. In juni werden alarmgeluidjes van de Nachtegaal gehoord.



Dode Nachtegaal

Gekraagde Roodstaart



Deze prachtige vogel is tijdens de trektijd in april en begin mei, een paar keer bij de behuizing gezien. Steeds om rondom het huis even wat insecten te vangen, en daarna weer door te trekken.



Gekraagde Roodstaart

Zwarte Roodstaart



De Zwarte Roodstaart was bijna het hele seizoen aanwezig rondom de behuizing. In het straatje langs de Romneyloos en langs de paadjes langs het huis af, is het bij bepaalde wind goed insecten jagen.

Omdat regelmatig juveniele roodstaarten zo hebben gezien, eind juni met vier exemplaren bij elkaar, stellen we dat hij dit jaar gebroed heeft op Rottumerplaat.



Zwarte Roodstaart

Tapuit




In de maanden april en mei hielden zich meerdere Tapuiten op op het eiland. Er werden doortrekkende Tapuiten gezien aan de Westpunt, langs de Noordkant van de stuifdijk en ook bij de kwelder langs de Westgeul. In mei werd duidelijk dat er in de duinvallei bij de 3^e knik 2 paartjes Tapuit bleven hangen. Op deze locatie hebben beide paartjes succesvol gebroed. Zie verder hoofdstuk 'broedresultaten'. Begin juli zagen we op die locatie een adulte Tapuit met voedsel in de bek. Dit lijkt te duiden op een 2^e legsel van één van de paren.




Tapuit

Paapje




Het Paapje werd in een korte periode relatief frequent gezien langs de stuifdijk. Omdat deze vogels graag hoog in struikjes zitten, laat hij zich makkelijk zien aan de vogelwachters.

Roodborsttapuit




De Roodborsttapuit zagen we in het vroege voorjaar doortrekken. In totaal hebben we de 'robotap' 3 maal waargenomen.




Roodborsttapuit

Zanglijster




In april hebben we rondom de behuizing en langs de stuifdijk meerdere keren kleine groepjes Zanglijsters gezien, en vaker nog gehoord. De soort is niet als broedvogel vastgesteld.

Koperwiek




In april was de Koperwiek een veel geziene doortrekker op het eiland. Bijna dagelijks kwamen we Koperwieken tegen. Vanaf begin mei waren ze allemaal door.

Grote Lijster



Er wordt één keer een Grote Lijster gezien: hij laat zich kort zien bij de duinovergang.

Kramsvogel




In de loop van april kwamen er steeds meer Kramsvogels langstrekken. Eind april was er een groep van 14 beesten die een paar dagen bleven pleisteren.

Merel




In het begin van het seizoen laat de Merel zich om het huis gemakkelijk zien. Later zien we alleen zo af en toe een flits, een geluidje: de Merel was er dus wel, maar heel erg onder de radar.

Beflijster




In april, ten tijde van de doortrek van de lijstersoorten, was ook de Beflijster af en toe te zien. Vaak dichtbij huis is de duindoorns, wegvliegend met hun kenmerkende roepje.

Tuinfluit



Tijdens een BMP-ronde beging mei wordt één zingende Tuinfluit aan de westzijde van het eiland in een duindoornstruikje gezien. Later in mei wordt tijdens een avondronde nog een zingend exemplaar in het Kraaienbos gehoord. Dit waren losse, doortrekkende beesten, de Tuinfluit heeft niet op het eiland gebroed.

Zwartkop



In het begin van het seizoen was er nog veel doortrek van de Zwartkoppen.

Vanaf 19 april horen we de Zwartkop regelmatig fluiten bij de behuizing en zien we zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren. Medio mei wordt het stil, en horen we alleen zo af en toe een klein alarmroepje. Vanaf juni horen we de Zwartkop weer zingen; zowel bij de behuizing, als in door ons benoemde 'kiekevlief' (vlier op de stuifdijk 300m westelijk van de behuizing waar ook een paartje Bruine Kiekendief nestelde).

Grasmus



De Grasmus is ieder voorjaar één van de latere binnenkomers; en dan komen er ook meteen heel veel. Zowel bij de behuizing, als op meerdere plekken langs de stuifdijk, laat het mannetje zich uitgebreid horen en zien; ze zingen luidkeels in de toppen van struikjes.

Braamsluiper



De Braamsluiper laat zich vanaf eind april veelvuldig horen. Steeds is het op 2 locaties raak: bij de behuizing en bij het Kraaienbos. We denken dat de Braamsluiper op beide locaties tot broeden is gekomen.

Bij de behuizing, hier zijn natuurlijk dagelijks waarnemingen te doen, zong de braamsluiper veelvuldig, en liet hij in juni veelvuldig alarmroepjes horen.

Rietzanger



Op één losse waarneming in april, vlakbij de behuizing, na leek de Rietzanger afwezig. Tot begin juni de Rietzanger opdook in de duindoorns voorbij het Middenbos. Daar hoorden en zagen we hem 4x zingend. Toch een broedgeval kunnen optekenen.

Sprinkhaanzanger



De Sprinkhaanzanger had zijn eigen duindoornveldje voorbij het Middenbos. Hier hoorden en zagen we hem meerdere keren in mei en begin juni.



Sprinkhaanzanger op zangpost in duindoorn

Kleine Karekiet



De Kleine Karekiet is 2x gehoord bij de behuizing. De eerste liet zich een paar keer heel zachtjes, kort, horen. De tweede waarneming was wat duidelijker te horen. Ook al werden de waarnemingen op dezelfde plek gedaan, we gaan er vanuit dat het hier een doortrekkend exemplaar betrof.

Bosrietzanger




Deze late soort, werd op 1 juni voor het eerst gehoord op Rottumerplaat. Enkele weken later hoorden we er nogmaals één.

Spotvogel



Na een doortrekkend beest dat we één dag hoorden bij de behuizing, bleven er in juni op twee plekken op het eiland steeds weer Spotvogels te horen; bij de behuizing en in het Kraaienbosje. We tellen deze twee als nieuwe broedvogels op Rottumerplaat en daarmee is het een nieuwe broedsoort op het eiland.


Fitis



De Fitis trok in april door, een exemplaar in het Middenbos zong in april/mei steevast vanuit het Middenbos.

Regelmatig was de Fitis 's ochtends bij de
behuizing te horen.

Grauwe Fitis




Op 8 juni wordt er een onbekende zang gehoord. De Merlin-app en een hulplijntje naar een bevriende vogelaar geeft uitkomst: de zeldzame Grauwe Fitis zat te zingen in het Kraaienbos. Het betreft hier de 3^e waarneming op Rottumerplaat.

Tjiftjaf




Daar waar de Tijftjaffen aan de vaste wal al vanaf begin maart territoria claimen, loopt dit op Rottumerplaat een paar weken achter. In de eerste week vooral doortrekkende Tijftjaffen. Vanaf medio april worden steeds vaker zingende Tijftjaffen gehoord. Zowel bij de behuizing als in het Middenbos bevinden zich territoria van de Tijftjaf. Het exemplaar bij de behuizing laat zich door de weken heen regelmatig even kort in de ochtend horen. In augustus zijn het er opeens heel veel, de trek is duidelijk begonnen.

Goudhaan




Op de eerste dag dat de vogelwachters op het eiland waren, tijdens een eerste verkenning bij het Kraaienbos, zaten er Goudhaantjes in het Kraaienbos. Het bleken doortrekkende exemplaren; daarna niet meer waargenomen.

Iberische Tjiftjaf




Op 29 juni zien onze gasten een mogelijke/ waarschijnlijke Iberische Tjiftjaf bij de behuizing. De definitieve toekenning door het CDNA voor deze waarneming moet nog komen. Extra spannend omdat het slechts een observatie op basis van uiterlijk betreft, zonder een geluidsopname. Het zou de tweede waarneming ooit op Rottumerplaat zijn van deze soort.

Vuurgoudhaan




Op onze eerste werkdag zien we een
Vuurgoudhaan in de struiken bij de eerste knik.
Later, op 11 april zien we uit het raam een fraaie
Vuurgoudhaan in de tuin.

Winterkoning



In het vroege voorjaar werden er Winterkoningen rondom de behuizing, maar ook in het Kraaienbos, waargenomen. Op 10 april zien we een Winterkoning mét voedsel in de bek, de struiken in vliegen. Verder laat de Winterkoning zich het voorjaar weinig zien of horen.


Grauwe Vliegenvanger



Tweemaal werd er tijdens de voorjaarsstrek een Grauwe Vliegenvanger gezien op het eiland: een keer bij het Middenbos, en een keer bij de behuizing.

In juli laat een Grauwe Vliegenvanger zich zachtjes horen bij de behuizing.

Bonte Vliegenvanger




Rond de paasdagen (medio april) zijn er ruim een week Bonte Vliegenvangers rondom de behuizing aanwezig. We zien ze veelvuldig jagen op de vliegen die op de warme muren van het huis afkomen, en jagen in het windluwe straatje langs de Romneyloods. Na deze periode zijn de Bonte Vliegenvangers doorgetrokken en niet meer waargenomen.




Bonte Vliegenvanger

Pimpelmees



Op 25 april zit er een Pimpelmees bij de
behuizing: foeragerend in de abelen achter het
huis laat hij zich even mooi zien.

Grauwe Klauwier



Tijdens een moment dat er tijdens een aflossing even een oud-vogelwachter op het eiland is, merkt hij een Grauwe Klauwier op in de duindoorns bij de telpost. Na die ene dag met waarnemingen zijn er geen Grauwe Klauwieren gezien.

Kauw



Kauwen zijn holenbroeders; op Rottumerplaat maken ze gebruik van verlaten konijnenholen. In het begin van het seizoen zagen we to 17 exemplaren, soms groepsgewijs, rondvliegen. Tijdens een van onze wandelingen horen en jonge Kauwen piepen vanuit een hol. Een filmpje hiervan hebben we op ons Insta-account @Rottumerplaatje geplaatst. Eind juni worden er in totaal 37 Kauwen geteld; adulten en juvenielen samen.

Zwarte Kraai




De Zwarte Kraai is alom aanwezig op het eiland. Broedend in de bosjes langs de stuifdijk, bestrijken ze het hele eiland om voedsel te zoeken. We hebben 7 nesten gevolgd door het seizoen heen. De mooie gespikkelde eitjes en eigenwijze jongen waren prachtig. Er zijn 14 jongen uitgevlogen.



Jonge Zwarte Kraai

Raaf



Vanaf het hoge bankje, werd op 6 april een overvliegende Raaf waargenomen. De Raaf vloog richting NO.

Dat was na 2004 en 2021 de 3^e keer dat er een Raaf is waargenomen op Rottumerplaat.


Spreeuw



Vorig jaar broedde er nog een Spreeuw bij de behuizing. De desbetreffende plek hebben we goed in de gaten gehouden. Maar dit jaar is de Spreeuw alleen als veelvuldige gast en doortrekken gezien.

In het vroege voorjaar als doortrekker. Vanaf medio juni hangen er dagelijks groepen van 30-50 Spreeuwen, waarvan er veel juveniele beesten zijn, rond op het eiland.


Wielewaal



Op 27 mei hoorden we vanuit het Middenbos opeens het kenmerkende 'dudeljo'!


Een langstreckende Wielewaal. De dag erna hebben we nog gecheckt of hij langer bij ons zou blijven, maar de vogel was alweer gevlogen.

Vink



Anders dan aan de vaste wal, is de Vink op Rottumerplaat een minder algemene verschijning: Hij komt als trekvogel langstrekken richting het noorden. Dit seizoen hebben we op 3 dagen Vinken rondom de behuizing gezien.

Keep



De Keep, een vogel uit de vinkenfamilie, broedt noordelijk van Nederland. In de winter zijn ze veelvuldig in ons land te vinden. Tijdens de voorjaars trek zijn er een paar keer langstreckende Kepen waargenomen.

Kneu



De Kneu is een dagelijkse verschijning voor de vogelwachters: rondom de behuizing en op enkele andere plekken langs de stuifdijk, broeden meerdere paartjes Kneu. Ze zijn ook vaste gast in één van de zoetwatervijvertjes rondom het huis.




Mannetje kneu

De Kneu is daarnaast ook een doortrekker langs het eiland: in het begin van het seizoen treffen we langstreckende groepjes aan. Na de broedperiode zagen we ook groepjes adulten met juvenielen op het eiland foerageren.




Nestje van de Kneu

Barmsijs




Al redelijk vroeg in het trekseizoen zagen we een groepje Barmsijzen opvliegen vanuit de kweldervegetatie op de Noordkwelder.

Rietgors



De afgelopen jaren hebben er regelmatig Rietgorzen op Rottumerplaat gebroed. Dit jaar waren de waarnemingen schaars. In de eerste week en begin mei zagen we een mannetje zingen. Eind juni zagen we op één dag 2 mannetjes Rietgors. Deze hebben we later niet meer terug gevonden.

Geelgors



Op 11 mei zagen we één exemplaar Geelgors in een groepje vinkachtigen, bij de telpost langsvliegen. Eind juni spot de scholeksterringer een exemplaar in een struikje op de stuifdijk.

Het mysterie van de verdwenen ganzenkuikens

Door: Addo van der Eijk

Het broedseizoen start hier met de grauwe ganzen. Begin april zagen we bijna overal op Rottumerplaat ganzen op het nest zitten. Geregeld vloog een ouder verschrikt op. Drie weken later vinden we veel lege nesten, maar geen ganzenkuikens. Een mysterie. Waar zijn de kuikens gebleven?

Superschattig zijn ze, die ganzenkuikens. Op 6 april, tijdens onze eerste ronde om de broedvogels in kaart te brengen, zagen we ze voor het eerst; vijf piepende kuikens op het nest. Overal op het eiland lagen begin deze maand nesten van grauwe ganzen. Met gemiddeld 5,2 eieren per nest, aldus een studie van onze voorgangers. Die nesten liggen uitermate strategisch. Net als de Noord-Groningers en Friezen, die op wierden en terpen woonden om de voeten droog te houden, kiezen de ganzen bijna altijd het hoogste punt. Het extreme hoogwater van 5 april, toen het water net niet de twee meter +NAP aantikte, deerde de grauwe ganzen dan ook nauwelijks. Alleen uit laaggelegen nesten verdwenen eieren met het wassende water.



Grauwe gans op haar nest

Slechts tientallen kuikens

Twee weken later start onze tweede ronde broedvogelmonitoring. We verheugen ons. We zullen nu wel vele honderden gele ganzenkuikens zien, schatten we in. Frank neemt zijn klikker mee, om onderweg makkelijker te tellen. De klikker blijkt niet nodig. Slechts enkele tientallen kuikens komen we tegen, telkens luid piepend met een gakkende ouder. Het opvallende gedrag doet ons vermoeden dat de rest zich niet ergens verstoopt. Maar waar blijven ze dan? Eerdere vogelwachters merkten de grote verdwijntruc ook al op. In 2019 berekenden ze meer dan zevenhonderd eieren. “Maar tijdens de tellingen


zagen we later geen vliegvlugge grauwe ganzen”, meldt hun verslag.



Nest met ganzenkuikens

Nauwe familiebanden

We leggen het mysterie voor aan Berend Voslamber, dé grauwe ganzenautoriteit van ons land. Begin jaren tachtig startte zijn onderzoek naar de soort. Als pensionado schrijft hij nu een boek dat hopelijk eind volgend jaar uitkomt. Voslamber zag het aantal grauwe ganzen explosief toenemen in Nederland. “Toen ik begon was de grauwe gans extreem zeldzaam. De soort stond zelfs op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Nu broedt hij overal in het land, zelfs in het centrum van steden en op de Waddeneilanden. Op de eilanden, ook Rottumerplaat, kunnen ze veilig broeden omdat er geen grondpredatoren zijn.” Absoluut fascinerend vindt hij de ganzen. Voslamber dicht ze menselijke eigenschappen toe, waarbij vooral de familieband opvalt. “Het hele eerste levensjaar blijven jongen bij hun ouders. Zelfs jaren later herkennen ouders hun jongen. Ik had eens een groep met twee jaargroepen jongen: die van het jaar én die van het jaar ervoor. De jongen kwamen terug en trokken gewoon nog een jaartje met hun nieuwe broers en zussen op.”



Overvliegende grauwe ganzen

Mals gras

“Er zouden nu volop jongen moeten zijn”, reageert Voslamber wanneer we ons dilemma voorleggen. “Zien jullie schaalresten in de nestbodem?” vraagt hij. Ja, antwoorden we. “Dan zijn de eieren wel uitgekomen. Omdat er weinig opengehakte eieren zijn, lijken de meeste eieren niet door meeuwen, kraaien of roofvogels opgegeten.” Na even nadenken, vraagt hij: “Groeit er wel gras op het eiland? Het hoeft geen

bemest boerengras te zijn, maar wel jong en mals gras.” Nee, zeggen we, want de kwelder oogt nog dor en grijs, en in de duinen groeit enkel oneetbaar helmgras. “Dan zijn de ouders met hun kuikens op weg naar hun opgroeigebied elders”, concludeert Voslamber.



Foto op Instagram @rottumerplaatje

Superschattig

De verklaring begint te gloren. Meerdere keren zagen we al ouders met kuikens op het strand. De kuikens namen een aanloop om de branding door te komen, een nagenoeg onmogelijke opgave met de hoge golven. Frank maakte er fraaie foto's van. Meer dan 360 'likes' kregen ze op ons dagelijks @Rottumerplaatje op Instagram. “Gewoon niet het beste idee van deze opvoeder”, schreef Frank erbij. “Wat onwijs schattig”, reageren velen, aangevuld met hartjes en smileys. De werkelijkheid blijkt een stuk wreder. Voslamber: “Ik denk dat de ganzenfamilies de Noordzee op zijn.”

Vijftien kilometer

Dat ganzenfamilies na het broeden tien tot vijftien kilometer kunnen verkassen naar een opgroeigebied is bekend. “Broeden ze in een gebied waar niets te eten is, vaak een moeras, dan trekken ze met hun piepjonge kuikens al snel weg. Een gans uit Zeewolde, die we met een zender konden volgen, dook vijftien kilometer verderop met haar jongen weer op. De kuikens, pas twee tot drie dagen oud, hadden het hele eind gelopen en gezwommen.” Gangbaar is dit niet. Het gros van de ganzenkuikens in Nederland groeit op in de buurt van hun nest. Daar scharrelen ze tweeëneenhalve maand rond, tot ze begin juli zelf kunnen vliegen.



Ouder met de jongen op weg naar zee

Lastige oversteek

Rondom Rottumerplaat ligt zee, met de Groninger kust op dertien kilometer afstand, Schiermonnikoog op zeventien kilometer en Borkum op dertien kilometer. Is er een kans dat de kuikens het groene gras bereiken? Voslamber heeft er een hard hoofd over in. “Het zou kunnen, maar het is absoluut een lastige oversteek. Ik weet van kuikens bij de Ooijpolder in Nijmegen die soms om goed voedsel te vinden de Waal moeten overzwemmen. Door de sterke stroming lukt dat pas als ze drie tot vier weken oud zijn. Zo oud zijn jullie kuikens nog niet. Naast de golven zijn kuikens op zee kwetsbaar voor meeuwen. De ouders kunnen ze daar niet beschermen.” Vorige vogelwachters zagen al hoe kuikens op de Noordzee ten prooi vielen aan meeuwen. Ondanks de barre tocht, en de lage overlevingskansen van hun kuikens, komen grauwe ganzen elk jaar terug op Rottumerplaat. Al jaren achtereen, in steeds grotere aantallen. Voslamber geeft een tip mee: “Volg de ganzenkuikens na het uitkomen van de eieren. Wegtrekken richting zee gebeurt al in de eerste dagen.”



Pootafdrukken van ouder met jongen

Ganzenfamilie volgen

Een dag later volgen we zijn advies op. We zien twee ouders met zes ganzenkuikens. Op verre afstand volgen we ze, in de hoop dat ze richting zee lopen. De ouders sluipen door de kwelders en duinen, met hun kop omlaag zodat ze niet boven de vegetatie uitsteken. Een paar andere ganzen houden de wacht. Ze vormen een escorte, kijken steeds rond en gaffen agressief als een meeuw overvliegt. Ook de ouders maken zich dan groot en slaan met hun vleugels. Na anderhalf uur bespieden, belanden we na een lange lus weer op het startpunt. De familie verdwijnt in een rietveld waar ze ogenschijnlijk nooit meer uitkomen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd als Boswachtersblog op de website van Staatsbosbeheer tijdens het vogelwachtersseizoen 2021.

5.2 Broedvogels

Telmethodiek broedvogels

Territoriumkartering

De meeste broedvogelsoorten zijn in 2025 op Rottumerplaat geïnventariseerd volgens de Broedvogel Monitorings Project-methode (Sovon, 2016). Uiteindelijk zijn zes volledige BMP-ronden uitgevoerd. Pot & Branderhorst stelden in 2019 vijf deelgebieden vast, waarbij ze per keer een deelgebied in kaart brachten. Omdat er aan de westzijden van het eiland sindsdien een groot stuk van het eiland is ondergestoven en het overzicht in sommige rondes wat sneller te verkrijgen was hebben we soms de route in 4 dagen kunnen lopen en een net wat andere verdeling aangehouden. Elke BMP-ronde is het hele eiland bezocht, maar de ene keer is er bijvoorbeeld voor gekozen om het Noordrif apart te bezoeken, een andere keer werd op een dag het Noordrif met de Noordkwelder gecombineerd. Ook de Zuiderduinen gingen soms mee met de lage kwelder, andere keren met de Zuidkwelder. De BMP-tellingen vonden zoveel mogelijk tijdens laagwater plaats om niet bij hoogwater de overtuigende vogels te verstoren. De stuifdijk en de bosschages rond de behuizing zijn, indien mogelijk, 's ochtends bezocht. Het meest Oostelijke gedeelte van het Noorderstrand is regelmatig bezocht, maar relevante waarnemingen leverde dat slechts tweemaal op waardoor het in de waarnemingssoftware lijkt alsof we dat gedeelte hebben overgeslagen in de monitoring.

Voor het invoeren van de gegevens is gebruikgemaakt van de app Avimap op onze telefoon. De verschillende bezoeken werden 'thuis' telkens gekoppeld aan een hoofdbezoek. Aanvullende waarnemingen zijn naderhand toegevoegd aan de BMP-ronde. Dit waren alleen relevante nieuwe soorten die in de periode rond de BMP-ronden waren gezien of soorten op 'nieuwe' plekken. Dubbeltellingen zijn op deze wijze vermeden.

Ganzenronde, tijdens de eerste week op het eiland hebben we alle Grauwe Ganzen nesten bezocht en geteld. Voor Marcel was dit een eerste intensieve kennismaking met de loop van alle slenkjes op de kwelder.

Eerste ronde, uitgevoerd tussen 8 en 13 april. In deze ronde zijn vooral Veldleeuweriken ingevoerd. Ook is het moment dat de bomen nog geen bladeren hebben gebruikt om alle oude grote nesten in te tekenen, daarmee bespaarden we ons in de latere rondes een hoop gespeur naar Buizerd en Kraaiennesten.

Tweede ronde, uitgevoerd tussen 23 en 28 april. Tijdens deze ronde waren de Graspiepers lekker actief en kwamen we de eerste Eider nesten tegen. Verder tal van andere soorten, zoals wederom de Veldleeuwerik, ingevoerd.

Derde ronde, uitgevoerd tussen 7 en 13 mei. In deze periode overal op- en overvliegende Bergeenden, Scholeksters en Tureluurs.

Vierde ronde, uitgevoerd tussen 20 en 24 mei. Deze ronde de focus gelegd op het definitief in kaart brengen van de meeuwenkolonies en overige kolonievogels.

Vijfde ronde, uitgevoerd tussen 7 en 12 juni. Deze ronde werd even onderbroken door een tweedaags bezoek van de Lepelaarringers.

Zesde ronde, tussen 23 en 25 juni liepen we nog een ronde waar we wat extra aandacht hebben besteed aan soorten waarvan we nog niet helemaal zeker waren of het aantal ingevoerde broedparen een goed beeld van de situatie gaven.

Meeuwenkolonies, van 26-29 juni telden we middels de raaienmethode de gemengde meeuwenkolonies.

Een aparte nachtronde is niet over het gehele terrein gelopen.

Andere telmethoden

De BMP-methode is erop gericht om in verschillende rondes op basis van territoria het aantal 'waarschijnlijke' broedparen vast te stellen. Voor kolonievogels zijn door Sovon specifieke methoden beschreven. Daar waar keuzes gemaakt moeten worden hoe die in het veld worden toegepast hebben we er de voorkeur gegeven aan de gemaakte keuzes in de voorgaande jaren omdat dit de vergelijkbaarheid van de aantallen door de jaren heen bevordert. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de keuze om het aantal broedpaar van de aanwezige roofvogels op basis van gevonden nesten te bepalen. De werkwijze van de methoden staan per soort beschreven.

Nesten in AviNest

Behalve in Avimap zijn veel nesten ook ingevoerd in de app AviNest. AviNest maakt het mogelijk om nestgegevens direct in het veld in te voeren. De app is afgestemd op de Nestkaart-systematiek van Sovon. Het Meetnet Nestkaarten is gestart in 1995 als belangrijke aanvulling op de broedvogelmonitoring. Broedbiologische gegevens zijn van belang om de oorzaken van aantalsveranderingen te achterhalen of eventueel zulke veranderingen al in een vroeg stadium te zien aankomen ('early warning'). Van de volgende soorten zijn nesten ingevoerd: Scholekster, Bontbekplevier, Strandplevier, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern, Buizerd, Bruine Kiekendief, Zwarte Kraai en een enkel nestje van de Kneu. Elk ingevoerd nest is meerdere keren bezocht, in elk geval in de eifase, de jongenfase en een nacontrole om te bepalen of de jongen waren uitgevlogen of dat het nest mislukt was. Bij de grote soorten is het nest tussen de tien en veertien dagen bezocht.

Wel/niet meetellen van twijfelgevallen

Uit de op het eiland beschikbare vogelwachtersrapportages blijkt dat voor het wel of niet meetellen van broedvogels door de vogelwachters andere keuzes zijn gemaakt. Het gevolg is dat de waarden in de tijdreeksen niet altijd gebaseerd zijn op dezelfde aannames en in dat geval niet volledig onderling vergelijkbaar zijn. De autoclustering van Sovon blijkt niet altijd overeen te komen met de waarneming van de vogelwachters in het veld. Het komt meerdere keren voor dat de autoclustering van Sovon één of meerdere waarnemingen clustert als een territorium, terwijl de vogelwachters met zekerheid kunnen stellen dat op het eiland geen paar heeft gebroed. Die onduidelijkheid doet zich vooral voor met zangvogels op Rottumerplaat. De door Sovon per soort opgestelde datumgrenzen hebben onder meer het doel doortrekkende - en dus niet lokaal-broedende - vogels uit de data te filteren. Na het ingaan van de datumgrenzen is de kans op een doortrekker relatief klein. Op Rottumerplaat is in het voorjaar vanwege de geografische ligging echter sprake van late doortrek van zangvogels.

Het komt daarom relatief vaak voor dat doortrekkers zich (zingend) op het eiland ophouden, ook ná het ingaan van de datumgrenzen, maar na één of een paar dagen weer vertrokken zijn.

Om over dergelijke situaties duidelijkheid te verschaffen is in 2021 contact opgenomen met Dirk Dijkshoorn, ecoloog van Staatsbosbeheer, en Jelle Postma, meetnetcoördinator van Sovon. Vervolgens zijn voor Rottumerplaat de volgende richtlijnen opgesteld:

- Wijk bij sterke vermoedens dat de soort NIET op het eiland broedt af van de autoclustering van Sovon en verwijder in het rapport het territorium uit de broedvogeltelling.
- Bekijk bij twijfel extra of de waarneming wel in geschikt broedbiotoop is en wees vooral bij zingende vogels in de doortrekperiode extra kritisch. Bij lagere broedcodes 1, 2 en 3 bij voorkeur pas territorium aannemen als vogel twee keer op dezelfde plek heeft gezongen met tussenperiode van minimaal 10 dagen.
- Houd bij redelijke twijfel vast aan de BMPmethode en de autoclustering.
- Probeer bij 'sterke vermoedens' en bij 'twijfel' om uitsluitel te krijgen in het veld en beschrijf in het rapport uitvoerig de gemaakte keuzes, zodat deze duidelijk zijn voor toekomstige vogelwachters op Rottumerplaat. Bij zeldzame soorten kan het zinvol zijn om meer zekerheid te verkrijgen door gedurende langere tijd het gedrag te observeren (van afstand) of een of enkele dagen later opnieuw een waarneming te doen.

Deze richtlijnen zijn inmiddels onderdeel van de Handleiding Monitoring Rottumerplaat van Rijkswaterstaat. Op basis van bovenstaande richtlijnen is in 2025 voor de volgende vogelsoorten ervoor gekozen om ze NIET als broedpaar te rekenen, terwijl de autoclustering van Sovon ze wel als territorium heeft vastgesteld: : Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Wielewaal en Rietgors. Deze soorten staan in het overzicht als nul broedpaar aangegeven. Per soort is aangegeven waarom de keuze is gemaakt.


Historische gegevens

Bij de overgang van de coördinatie van de vogelwachters van Staatsbosbeheer naar Rijkswaterstaat zijn alle verzamelde spullen in

de behuizing ook weer eens allemaal kritisch bekeken. Dit bracht behalve wat meer orde en beschikbare ruimte ook een mooie vondst van een enorme stapel vogelwachtersrapporten uit de vorige eeuw. De grafieken die sinds 2021 standaard onderdeel lijken te zijn geworden van de rapportages zijn daarmee in deze editie verrijkt met nog eens ruim 30 jaar geschiedenis. Niet bij alle broedvogels zien we dat terug in de overzichten, het eiland heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en is voor sommige soorten pas in latere jaren interessant geworden. Voor andere soorten maakt dat die ontwikkeling het eiland juist minder geschikt maakt als broedplaats. Soorten die de laatste 5 jaar niet meer tot broeden zijn gekomen zijn uit het overzicht verhuisd naar de bijlage.

Soortbespreking broedvogels

In totaal zijn er dit jaar 52 broedvogelsoorten op het eiland vastgesteld. Dat zijn er weer wat meer dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Daarin zie je ook de ontwikkeling van het eiland terug, de groei zit vooral bij de zangertjes die in de steeds ouder wordende bomen en de uitdijende bosschages op en langs de stuifdijk broedgelegenheid vinden.



In deze paragraaf wordt de ontwikkeling per soort verder uitgewerkt. Onder het aantal broedpaar staat de hoogst waargenomen broedcode in de telrichtlijnen van Sovon. Een zingende vogel (code 2) telt, zoals de telrichtlijnen aangeven, hoger dan een paartje (code 3). Bij elke soort staat een grafiek met de aantalsontwikkeling in de afgelopen jaren (geel)

en het vastgestelde aantal in 2025 (blauw). De lichtgetinte delen van balken geeft aan dat het aantal territoria tussen twee waarden ligt. De onderliggende data in de grafieken zijn terug te vinden de bijlagen. In soorten die ook als broedvogel doelsoort in Natura 2000 staan vermeld is in bijna alle gevallen ook een landelijke broedvogel trendlijn geplot. De data daarvan zijn overgenomen van de Sovon website. De kaarten met locaties van de territoria zijn van een aantal soorten opgenomen, alleen wanneer het relevant werd geacht. De meeste kaarten met territoria zijn gegenereerd via de portal van Sovon (portal.sovon.nl). Voor de overige stippenkaarten verwijzen we naar het invoerportaal van Sovon waar de kaarten van de inventarisatiejaren ingezien kunnen worden. Bij de beschreven soorten in deze paragraaf staan ook de soorten waarvan de autoclustering van Sovon één of meerdere territoria heeft vastgesteld, maar die desondanks op nul zijn gezet. Ook zijn enkele broedvogels vermeld die in voorgaande jaren wél zijn waargenomen, maar in 2025 niet. Voor alle historische beschrijvingen van broedvogels op Rottumerplaat is gegrasduind in de uitgave Fauna van Rottum (Zekhuis & de Vries, 2012), het SOVON-rapport 'Broedvogelmonitoring op de Rottums in 2006-2017' (Postma & Koffijberg, 2019) en de jaarrapportages van eerdere vogelwachters op Rottumerplaat die beschikbaar waren op het eiland.

Grauwe Gans

Aantal broedpaar 2025: 227

Broedcode: 16 (Nest met jongen)


Methode: Nestentelling

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Nergens veilig.




Ontwikkeling van het aantal broedparen op Rottumerplaat de afgelopen jaren.

De Grauwe Gans is een relatieve nieuwkomer op Rottumerplaat. Sindsdien is het aantal broedparen explosief toegenomen. De Grauwe Gans broedt vroeg in het seizoen en ze zitten reeds op de eieren op het moment dat de vogelwachters aan op het eiland arriveren. In de eerste week worden zoveel mogelijk nesten ingetekend. De Grauwe Gans heeft haar nest meestal verstopt in of naast helmpollen of andere hoge vegetatie. De broedende ganzen vliegen op bij benadering. In deze eerste week werden 227 nesten gevonden, gemiddeld 5,21 eieren per nest. Dit is een minimaal aantal, we hebben nesten over het hoofd gezien. Later aangetroffen nesten zijn niet meer meegenomen in de telling.

Ondanks het steeds groter wordend aantal broedparen zijn ook dit jaar weer nauwelijks grotere jongen waargenomen. De vogelwachters schreven in 2021 een uitgebreide blog over dit fenomeen. Gebrek aan voedsel noopt de ganzen waarschijnlijk een gevaarlijke oversteek te maken.



Grauwe Ganzenjong op een gevaarlijke tocht.



Grauwe Ganzennesten op het eiland in 2025.

Grote Canadese Gans


Aantal broedpaar 2025: 1

Broedcode: 12 (Pas uitgevlogen jong)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Een samengesteld paar Grote Canadese Gans X Grauwe Gans begeleidt hun jongen tijdens een tweetal waargenomen wandelingen in de duinen tussen de Noorderplas en het strand. De waarneming van een volwassen hybride Grote Canadees X Grauwe Gans lijkt er op te duiden dit niet het eerste jaar was dat dit koppeltje succesvol was.



Pas recent broedparen Grote Canadese Gans

Brandgans

Aantal broedpaar 2025: 2-4


Broedcode: 15 (Nest met eieren)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en foerageren

Broedsucces: 1,5-3 jongen per paar

In 2025 is voor het eerst broedsucces vastgesteld.



In het zeeruveld ten westen van de Noorderplas broedt een Brandgans op een nest met 4 eieren. Even later, in mei, een waarneming van een paar met 2 pullen onderweg over de stuifdijk naar de Westgeul. Of de waargenomen pullen uit het eerder gevonden nest komen blijft ondanks de enorme afgelegde afstand tussen nest en plaats van waarneming onduidelijk.

De volgende dag zwemt een paar met 6 jongen die geul uit richting het Schild om even later op te duiken in de Nieuwe Binnenzee. Brandganzen nemen wel vaker pullen van anderen onder hun hoede, het aantal pullen wijst op minimaal een tweede broedpaar. Later in het seizoen vertoont

nog weer een ander paar duidelijk afleidingsgedrag op weer een heel andere plek.



Brandganzen met jonkies.

Nijlgans


Aantal broedpaar 2025: 5

Autoclustering Sovon: 11

Broedcode: 5 (Alarmerend)

Methode: Sovon-territoriumkartering en integrale eilandtelling

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Uit de tijdens de BMP_rondes ingevoerde waarnemingen ontstaat de indruk dat er 11 territoria zouden zijn. Nijlgeenzen verplaatsen zich makkelijk en vaak over het eiland, de tellingen vinden in naast elkaar gelegen deelgebieden op verschillende dagen plaats. De kans dat hetzelfde paar op meerdere plekken worden ingetekend is daarmee groot. Er bevonden zich in de hele periode maximaal 11 volwassen Nijlgeenzen tegelijk op het eiland dus

maximeren wij het aantal op 5 paar. Ons advies zou zijn om deze integrale telling toe te voegen aan de jaarlijkse methodiek. We zien behalve paarvorming en geblaas als we naderen geen indicaties van een broedpoging.

Bergeend

Aantal broedpaar 2025: 55-68

Broedcode: 12 (Donsjongen)


Methode: Sovon-territoriumkartering en integrale eilandtelling solitaire mannetjes

Natura 2000-doelsoort voor Waddenzee en

Noorzeekustzone: rust en foerageren

Deel broedpopulatie NL: 1 %

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Op Rottumerplaat neemt het aantal broedparen stevig toe sinds 2011. Na 2017 daalt dat aantal weer. Deze fluctuatie zou goed kunnen liggen in de wisselende manieren waarop het aantal Bergeenden in kaart wordt gebracht. Er is ook op dit moment geen beproefde manier om het aantal broedparen vast te stellen. De Bergeend broedt hier in konijnenholen, daarvan zijn er echt te veel om ze één voor één te inspecteren op bewoning. Duidelijk wakende mannetjes bij konijnenholen waar vrouwtjes zouden broeden zien we niet. Wel is er een aantal maal een vrouwtje dat uit een hol lijkt te zijn gevlucht nadat ze ons had horen naderen. Bij de methode van de territoriumkartering zijn het aantal paartjes dat wordt waargenomen binnen de datumgrenzen indicierend voor het aantal broedparen. Omdat de Bergeenden zich veelvuldig verplaatsen tussen de verschillende subgebieden stelt Sovon voor een tweetal integrale eilandtellingen van paren uit te voeren

tijdens laagwater. Hiermee wordt een risico op over- of ondertelling hopelijk ondervangen.

De waarnemingen uit de BMP-rondes clusteren tot 55 paar. Wij houden na overleg Sovon het hoogste aantal getelde paren uit de uitgevoerde integrale tellingen aan als bovengrens van het aantal broedparen. De integrale telling buiten de datumgrenzen geldt in dat geval als benodigde ondersteunende waarneming.

Bergeendtellingen	17-4	9-5	28-5
Paar	99 paar	50 paar	68 paar
Single	33	19	56



Bergeendpullen in een slenk van de lage kwelder.

Wilde Eend


Aantal broedpaar 2025: 12

Broedcode: 15 (Nest met ei)


Methode: Sovon-territoriumkartering

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.




Het aantal broedparen van de Wilde Eend piekte rond de eeuwwisseling. Sindsdien leek het aantal gestaag af te nemen. Dit jaar vliegen er tijdens het hele broedseizoen op meerdere plekken Wilde Eenden op. Deze plekken lagen bij aanvang van het broedseizoen in de buurt van de vele plasjes op de kwelder, deze plasjes droogden in april en mei snel op. Het nest met ei waar we op stuitten bleek de volgende dag al gepreedeerd.



Territoria van de Wilde Eend liggen op de oudere kwelders van het eiland.

Pijlstaart


Aantal broedpaar 2025: 0
Methode: Sovon-territoriumkartering
Rode lijst: bedreigd
Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren
In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.




Op 14 mei zien we een volwassen man op het wad tegenover de uitkijktoren. Binnen de datumgrenzen maar ruim op ruime afstand van mogelijk broedbiotoop. Het blijft ook bij deze waarneming, zijn soortgenoten zijn op dat moment al ruim twee weken vertrokken.

Slobeend

Aantal broedpaar 2025: 1
Broedcode: 3 (Paar in geschikt broedhabitat)
Methode: Sovon-territoriumkartering
Rode lijst: kwetsbaar
Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren
Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Waarnemingen van een paartje zowel aan het begin, als het einde van het broedseizoen. Alle waarnemingen zijn aan de noordzijde van de stuifdijk, niet ver van elkaar. Concretere aanwijzingen voor nesten, zoals alarm, afleidingsgedrag of een vrouwtje met jongen zijn niet waargenomen.



Wintertaling

Aantal broedpaar 2025: 1


Broedcode: 6 (Mogelijke nestlocatie)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Rode lijst: kwetsbaar

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Wintertaling is een schaarse broedvogel op Rottumerplaat. Aan het begin van het broedseizoen zijn er meerdere paren aanwezig op de plasjes van zowel de Zuid- als Noordkwelder. Tijdens het broedseizoen vliegt een mannetje verdacht laat op wanneer we ons langs een slenk op de Zuidkwelder begeven. Later die dag nemen we een paar in vlucht boven dezelfde locatie waar.

Eider

Aantal broedpaar 2025: 133 - 563

Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Nesten tellen en Gedifferentieerde telling
Oranje lijst


Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee

Natura 2000-doelsoort Noorzeekustzone: foerageren

Deel broedpopulatie NL: 18 %


Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Bijna een vijfde van alle Nederlandse broedparen Eider broedt op Rottumerplaat. Telling van het aantal broedende Eiders is een gecompliceerde zaak aangezien de vrouwtjes goed beschermd en in schutkleur gedurende de hele ei-fase plaats houden op het nest.



Aantal broedparen Eider de afgelopen jaren, met de landelijke trend sinds 1990. Voor soorten waarvoor in Natura 2000 in de Waddenzee een instandhoudingsdoelstelling als broedsoort is vastgesteld is de landelijke trend ook in de grafieken opgenomen.

Alle nesten zoeken zou veel te verstoring werken zeker gezien de altijd honger lijken te hebbende meeuwen waarmee ze hun nestlocaties delen. Toch ontkomen we er niet aan een aantal nesten te ontdekken tijdens de BMP-rondes. Het vrouwtje vliegt op het allerlaatste moment op, en wij dekken de nesten vervolgens af met plantmateriaal en het aanwezige dons in de hoop dat het vrouwtje terugkeert voordat de eieren te veel zijn afgekoeld of gepredeerd. Dit aantal nesten houden we jaarlijks aan als ondergrens van het aantal ingeschatte broedparen.



De tweede manier die op Rottumerplaat wordt gebruikt om het aantal Eidernesten te bepalen is het inschatten van het aantal vrouwtjes dat op het nest zal zitten. Deze gedifferentieerde telmethode staat uitgebreid beschreven op de website van Sovon maar komt er kort gezegd op neer dat je broedende vrouwtjes niet ziet, en dat ze dus niet geteld worden tijdens een Eider telling. Wanneer je aanneemt dat een broedpaar bestaat uit een man en een vrouw, maar je ziet meer mannen dan vrouwen dan zullen die missende vrouwtjes wel op een nest zitten. De uitkomst van deze methode, waar overigens een iets ingewikkeldere formule onder zit i.v.m. sub-adulte beesten, wordt de laatste jaren aangehouden als bovengrens van de aantalsbepaling. Daarvoor wordt op een aantal momenten tijdens hoogwater het aantal mannetjes, vrouwtjes en jonge mannen geteld.

Gedifferentieerde Eider telling	11 Apr	30 Apr	12 Mei	22 mei
getelde Mannen	671	800	747	982
getelde Vrouwen	329	275	583	831
getelde 2eKJ man	13	38	19	18
berekende Broedparen	355	563	183	169
volwassen vrouw	31,2%	21,3%	49,9%	45,3%


Eidercrèches

Al jaren wordt in de vogelwachtersverslagen opgemerkt dat op de Rottums maar nauwelijks Eidereendjes het volwassen stadium bereiken.

De crèches trekken de aandacht trekken van Zilvermeeuwen en we zien subadulte Grote Mantelmeeuwen succesvol prederen op pullen uit de crèches. De korte tijd dat er crèches zijn zwemmen ze tegen het tij in door de geulen richting wad, om vervolgens ook weer terug te keren. Tot op de dag dat ze zo goed als zijn verdwenen. Of ze worden opgegeten op het wad, of een andere route hebben genomen kunnen we niet zien. Op onze buureilanden Rottumeroog en Schiermonnikoog komen ze echter niet aan, ook daar dit jaar nauwelijks crèches en al helemaal niet met grotere pullen zo vernemen we.

Omdat er al eerder signalen waren dat er hier nauwelijks grotere pullen werden waargenomen is op verzoek van Sovon dit jaar op zowel Rottumerplaat als een aantal aangrenzende Waddeneilanden iedere decade het aantal Eiderpullen geteld en onderverdeeld op grootte. Dit jaar zien we helemaal geen grotere pullen, en

omdat we ook maar een korte periode crèches zien kunnen er ook nooit veel pullen een beter heenkomen hebben gevonden.




Het aantal Eiderpullen in de crèches tijdens de telling van 12 mei was ook gelijk het hoogste dagtotaal dit jaar. Dat is overigens niet eens de laagste score van de afgelopen jaren.



Moeder met pullen Eider.



Eiderpullen verzameld in crèches en beschermd door meerdere vrouwtjes leggen het toch nog vaak af tegen meeuwen die ook weer jongen te voeden hebben.




De in de rapporten genoteerde indicatie van het boedsucces van de Eiders op Rottumerplaat.

Niet ieder jaar is de maximale dagscore als indicatie voor het broedsucces genoteerd. Voor de trendlijn zijn alleen de groene stippen uit de grafiek meegenomen.

Vervroegde aanvang

In veel van de oude rapporten wordt melding gemaakt van de datum waarop het eerste/laatste ei en/of Eiderpul werden aangetroffen. We hebben de data bijeengebracht en grafisch vormgegeven. Uniek is dat dit het eerste jaar lijkt te zijn waarin we nog vele moeders op een nest met eieren treffen terwijl het moment waarop we de laatste pul waarnemen reeds lang is verstreken. Er vallen dus veel slachtoffers voordat jonge Eiders de geulen bereiken, waar we ze zeker zouden hebben opgemerkt. We zien predatie door Zilvermeeuwen en vinden lijkes bij Kraaiennesten.



Historische data van de fenologie van de Eidernesten.

Lepelaar

Aantal broedpaar 2025: 76 - 80

Broedcode: 16 (Nest met jongen)


Methode: Nesten tellen

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee

Deel broedpopulatie NL: 2 %

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Broedsucces: 0,96 jong per paar



De Lepelaars hebben hun plekken in de kolonies al ingenomen bij het begin van het vogelwachterseizoen. Klaarblijkelijk hebben ze het hoogwater van de week daarvoor overleefd, want bij ons eerste bezoek begin mei na krap een maandje liggen er al een hoop kuikens in de nesten. Het warme en op Rottumerplaat droge voorjaar maakt dat er al begin juni Lepelaars kunnen worden geringd. Tijdens het ringen blijken er 37 forse jongen waarvan er 18 ringen en vier ook nog een zender krijgen. Weer een maand later bevinden die zich tijdens laagwater op het wad en in de geulen, maar ook zijn er op dat moment nog 15 grote jongen in de kolonie. We brengen beide bezoeken de gebruikte nesten met gps in kaart en concluderen op basis daarvan 68 broedparen. In de laatste ronde begin augustus constateren we dat op drie na alle kuikens die de vorige keer nog klein of net uit het ei waren gekropen ook groot en (bijna) vliegvlug zijn geworden.

Nieuwe kolonies

Dit jaar broeden de Lepelaars behalve in de bekende kolonie ook op andere plekken. Eind mei is er sprake van een late, maar succesvolle



Lepelaars zijn bij aanvang echt superschattig.

vestiging van 8 tot 12 nesten verspreid over een tweetal nieuwe kolonietjes. Deze liggen zo'n 350 meter verwijderd van de bekende kolonie, in de buurt van de plek waar in 2022 ook al een tweetal nesten werden gevonden. Op deze plek zien we wel eieren en kleine jonkies in de nesten. Tijdens ons laatste bezoek in augustus waren er 6 zo groot dat we inschatten dat die grote kans hebben het te gaan redden.



Ligging van de Lepelaarkolonies, de noordelijk gelegen clusters zijn de "nieuwe kolonies" die pas wat later in het seizoen werden gesticht.

Broedsucces

We tellen 52 grote jongen, maar zien er tijdens het bezoek van begin juli nog zeker 11 uit het nest weggelopen. Ook lagen er nog 10 jongen en 4 eieren in de nesten, voornamelijk in de nieuwe kolonietjes. Meer informatie over het broedsucces daar hopen we uit een bezoek na ons verblijf van de opvolgende vrijwillige eilandwachters te ontvangen.


Waterral

Aantal broedpaar 2025: 1-2


Broedcode: 2 (Roepend)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar



We vinden eind april een vers dood volwassen exemplaar bij de behuizing. Die hadden we daar al eerder gehoord, maar nadien hebben we op deze locatie geen Waterral meer waargenomen. Wel gedurende het hele seizoen af en toe het karakteristieke gekrijs verderop langs de stuifdijk bij het Middenbos.



Bruine Kiekendief

Aantal broedpaar 2025: 8

Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Nesten tellen

Oranje lijst

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee


Deel broedpopulatie NL: 1 %

Ingevulde nestkaarten (aviNest): 8


Meer dan ooit op Rottumerplaat



Nestsucces: 50%

Broedsucces: 1,1 jong per nest



De Bruine Kiekendief is alom vertegenwoordigd op het eiland. Waar je maar kijkt zie je ze vliegen boven de kwelders en stuifdijk op zoek naar een maaltje. De eerste nesten vinden we al bij inspectie van de plekken waar we ze zien landen in geschikt broedbiotoop. Dat aantal wordt vergroot met nesten waar we tijdens de BMP-rondes het vrouwtje van opjagen. Laatste slag slaan we als de eieren net uit zijn gekomen. De jonge pullen produceren dan een paar dagen bijna continu een geluid dat sterk lijkt op de geluiden die hun ouders maken. We vinden zo in totaal 8 nesten, meer dan ooit op Rottumerplaat. In al die nesten worden eieren gelegd en bebroed. Die eieren komen echter niet allemaal uit, en ook niet alle kuikens veroveren vervolgens genoeg van het aangeleverde voer om daadwerkelijk uit te vliegen.





Sinds 2009 broedt de Buizerd op Rottumerplaat. De eerste jaren slechts één paar, sinds 2014 gaat het jaarlijks om twee of drie broedparen. Tijdens de eerste ronde over de stuifdijk tekenen we een aantal oude nesten in. Die zijn op dat moment nog goed vindbaar omdat de aanwezige bomen nog in blad moeten komen. Beide oude Buizerdnesten worden inderdaad bebroed blijkt tijdens de eerste inspectieronde. Met een spiegeltje op een uitschuifbare stok zien we in beide nesten eieren liggen. Bij één nest blijft het daarbij, het andere nest, bijna op de kop van de stuifdijk zien we de twee Buizerdjongen ieder bezoek wat groeien. In juni zitten beide takkelingen wat hoger in hun vlier, eind juni zien we ze beide rond stuntelen op en rond de stuifdijk. Tijdens het broedseizoen hangen er twee Buizerds rond op een plek die we tevoren niet op het vizier hadden, wellicht een tweede poging van het paar met het eerder verlaten nest, maar meerdere bezoeken aan en in de betreffende bosjes en bomen leverde niets op.



Jonge Kiekendieven: hongerig of benauwd?

Buizerd

Aantal broedpaar 2025: 2

Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Sovon-territoriumkartering


Ingevlude nestkaarten (aviNest): 2

Rode lijst: Gevoelig

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Nestsucces: 50%

Broedsucces: 1,0 jong per paar



Slechtvalk

Aantal broedpaar 2025: 0

Autoclustering Sovon: 2


Broedcode: 5 (Parent)

Methode: : Sovon-territoriumkartering en nesten tellen


Rode lijst: Gevoelig

Natura 2000-doelsoort Waddenzee: foerageren

Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Slechtvalk is al twintig jaar een regelmatige broeder op Rottumerplaat. De Slechtvalk maakt op Rottumerplaat een grondnest op jonge duintjes. Dit seizoen beginnen de Slechtvalken veelbelovend, we nemen regelmatig twee afzonderlijke paartjes waar. Eén paar op zuid en één paar ten noorden van de stuifdijk. We zien beide paartjes paren, maar vinden ondanks uitgebreid observeren en zoeken nergens iets wat zou kunnen doorgaan voor een nest. Ook zien we beide paren 'waakzaam rondvliegen', maar nooit alarmerend. Omdat de laatste jaren is gekozen te inventariseren op basis van gelokaliseerde nesten en stellen we om wille van de vergelijkbaarheid het aantal broedparen op 0



Scholekster

Aantal broedpaar 2025: 211

Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Sovon-territoriumkartering en binnen het CHIRPS gebied nesten tellen

Ingevulde nestkaarten (aviNest): 105

Oranje lijst


Natura 2000-doelsoort voor Waddenzee en

Noorzeekustzone: rust en foerageren

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Nestsucces (n=105): 44%

Broedsucces (n=69): 0,1 grotere jongen per paar.




De Scholeksters laten zich makkelijk in kaart brengen. Ze verdedigen hun territorium luidkeels tegen indringers, of dat nu andere Scholeksters, meeuwen, een Zeearend of vogelwachters zijn. Scholeksters binnen het CHIRPS gebied zijn niet meegenomen in de territoriumkartering. Langs deze eerste kilometer van de stuifdijk zijn de broedparen door nestmarkering en intensieve nestbezoek in kaart gebracht.


Van een drietal van deze nesten hebben we door de kleureringen van de ouders kunnen vaststellen dat het een herlegsel betrof, dit ruim een week na predatie van de eieren uit het eerdere nest. Op basis van ingenomen territoria en de datums waarop eieren in de nesten aanwezig waren stellen we dat de ruim 100 gevonden nesten in het aandachtsgebied van minimaal 69 broedparen zullen zijn geweest, de rest kunnen heel goed herlegsels zijn geweest. Dit aantal is opgeteld bij de autoclusteringresultaten van de tellingen op het rest van het eiland.

Tijdens inspectie van de gemarkeerde nesten langs de eerste kilometer van de stuifdijk zien we veel eieren uitkomen tot donsjongen. We zien er uiteindelijk slechts 7 jongen vliegvlug of bijna vliegvlug rondwandelen met hun ouders.

Scholeksternesten in CHIRPS gebied



Aan het einde van het vogelwachteizoen was er nog geen duidelijkheid over het lot van de jongen van dit Scholeksterstel. Zou het de uitzondering op de regel zijn en beide jongen vliegvlug krijgen?



Bovenstaand met de rode stippen de Scholeksterterritoria op de eiland maar buiten het CHIRPS aandachtsgebied.

Onderstaande blauwe stippen zijn de voor CHIRPS gevolgde nesten. Deze liggen in het allemaal langs de eerste kilometer van de stuifdijk gevolgde nesten.



Kluut

Aantal broedpaar 2025: 0


Methode: Sovon-territoriumkartering

Oranje lijst

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee

Natura 2000-doelsoort Noorzeekustzone: foerageren

Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Rond de eeuwwisseling was de Kluut hier nog vertegenwoordigd met maximaal 17 paar. Dit jaar geven de twee waarnemingen van Kluten in de eerste drie maanden van het broedseizoen geen aanleiding om te vermoeden dat er hier is gebroed.

Bontbekplevier

Aantal broedpaar 2025: 8

Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Nesten telling

Rode lijst: Kwetsbaar

Natura 2000-doelsoort broedvogel voor zowel de Noordzeekustzone als de Waddenzee

Deel broedpopulatie NL: 2 %


Ingevulde nestkaarten (aviNest): 12

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.


Broedsucces: > 1,5 jongen per paar



Bontbekplevier eitjes in een kuiltje in het zand.



Op de gobimatten en de puindammen rond de behuizing vinden we een 10 tal nesten dit seizoen. Drie daarvan blijken snel na vondst al weer gepredeerd of weggespoeld. Op basis van de reeds in eerdere jaren aangebrachte kleurringen kunnen we met zekerheid vaststellen dat die ouders weer snel aan een nieuw nestje begonnen. Ook op de schelpenstrandjes aan de zeereep (zowel zuidwest één als noord twee paar) broedden Bontbekplevieren. Omdat we daar minder vaak zicht op hebben kunnen we slechts in één geval daar het broedsucces vaststellen. We blijven wat betreft het waarnemen van pullen steken bij 7 die fors groter zijn geworden. Alleen de 6 paren waarvan we het broedsucces hebben kunnen vaststellen zijn meegenomen in de berekening.



Territoria van de Bontbekplevier. Meerdere nesten van éénzelfde broedpaar tellen als één broedpaar maar daardoor kans op een hoger nets- en broedsucces.

Strandplevier

Aantal broedpaar 2025: 1

Broedcode: 15 (Nest met eieren)

Methode: Sovon-territoriumkartering


Rode lijst: Bedreigd

Natura 2000-doelsoort broedvogel voor zowel de Noordzeekustzone als de Waddenzee

Ingevulde nestkaarten (aviNest): 1

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.


Broedsucces: 2 jongen per paar



In lijn met de landelijke trend nam ook het aantal broedparen Strandplevier hier gestaag af. Op Rottumerplaat is de Strandplevier zelfs geen jaarlijkse broeder meer. De schelpenstrandjes tussen de relatief jonge duintjes lijken bij uitstek geschikt broedhabitat. Deze bevinden zich zowel aan het Zuidwesterstrand als aan de noordoostzijde van het Noordrif. Dit jaar vinden we een nestje met 3 eitjes aan het Zuidwesterstrand, twee weken later treffen we daar alarmerende ouders en proberen ten minste twee jonge pullen zich te verstoppen tegen de helmpollen. We zien ze niet opgroeien, maar treffen daar in de weken erna nog wel ouders die ons weten af te leiden van hun kroost.



Jonge Strandplevier waant zich onzichtbaar.



Moeder Strandplevier houdt het scherp in de gaten.

Wulp

Aantal broedpaar 2025: 12

Broedcode: 7 (Alarmerend)


Methode: Sovon-territoriumkartering

Rode lijst: Kwetsbaar


Natura 2000-doelsoort voor Waddenzee en

Noorzeekustzone: rust en foerageren

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Wulp laat uitgebreid van zich horen in de buurt van zijn of haar nest. Omdat de Wulp haar nest aan de rand van meeuwenkolonies lijkt te kiezen valt er genoeg te verdedigen, zeker als bijvoorbeeld de vogelwachters in de buurt zijn en ook alle meeuwen dus op de wieken. Op deze wijze komen we uit op het hoogste aantal broedparen ooit op Rottumerplaat.



Ligging van de territoria van de wulp. Alarmerende wulpen zijn makkelijk te vinden, nesten daarentegen vinden we niet.

Tureluur

Aantal broedpaar 2025: 53

Broedcode: 15 (Nest met eieren)


Methode: Sovon-territoriumkartering

Rode lijst: Gevoelig


Natura 2000-doelsoort Waddenzee: rust en

foerageren

Meer dan ooit op Rottumerplaat



De Tureluur lijkt zich goed thuis te voelen langs de vele natte plekken op de lage kwelder. Ook langs de slenken van de hoge Zuidkwelder nemen we er velen waar. In de latere rondes, wanneer het alarmeren zich beperkt tot het verdedigen van een kleinere cirkel rondom de nestlocatie vliegen ze ons links en rechts om de oren. In de tweede helft van juni zien we meerdere jonkies langs de grote slenk.



Kokmeeuw

Aantal broedpaar 2025: 2


Broedcode: 15 (Nest met eieren)

Methode: Nesten tellen

Oranje lijst


Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Nestsucces: 0%



De Kokmeeuw blijft lang afwezig rond de puindammen waar ze eerdere jaren een gemengde kolonie vormden met voornamelijk Visdieven. Die laatsten lijken dan ook lang te twijfelen over de geschiktheid om dit jaar hier een kolonie te vormen.

Pas medio juni nemen volwassen Kokmeeuwen langer plaats op puindam 3. Eén nestjes met twee eitjes spoelt een paar dagen later weg tijdens een vloed met verhoging (161 +NAP) op 23 juni, het laatste nest krijgt het hoogwater van een week later voor de kiezen.



Ligging van de dit jaar wel erg bescheiden Kokmeeuwenkolonie

Stormmeeuw

Aantal broedpaar 2025: 28


Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Nesten tellen

Oranje lijst

Deel broedpopulatie NL: 1 %

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Stormmeeuwkolonie bevindt zich dit jaar op het oostelijk gedeelte van de kwelder bij het Noordrif. Er zit enige variatie in de luchtellingen van het aantal Stormmeeuwen bij de kolonie maar we schatten dat het er zo'n 75 zijn. Dat zou volgens Sovon neerkomen op 50 broedparen. Aan de grond vinden we fors minder gevulde nesten. We gaan nog twee maal terug en vinden telkens meer maar vooral, blijkt uit gps gegevens, andere nesten. Hoewel ze niet goed verstopt lijken blijken we slecht overzicht te verkrijgen. Hoewel je de gegevens uit de luchtelling zou kunnen gebruiken geven we voorkeur om dezelfde methode als de jaren ervoor te gebruiken en gebruiken de nesttelling. Op basis van de gecombineerde gps gegevens van de verschillende bezoeken komen we op 28 verschillende nesten met eieren.



Stormmeeuwenkolonie op het Noordrif

Gemengde meeuwenkolonies

De Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen broeden op Rottumerplaat in gemengde kolonies. In de handleiding Monitoring Rottumerplaat staat beschreven dat er gekozen is om de nesten in deze kolonies niet individueel te gaan tellen. Ook van het op soort brengen van de gevonden nesten tijdens het lopen van raaien wordt af gezien en vervangen door een verhoudingsschatting van de ouderbeesten tijdens meerdere luchtellingen in de verschillende kolonies. De overwegingen om dit zo aan te pakken staat uitgebreid beschreven in het vogelwachtersverslag van 2021 (Van der Eijk en Oosterhoff). De aandachtspunten tijdens het raailopen en luchtellingen staan benoemd in de handleiding.

De verhoudingsgetallen eiland breed (ook dit jaar ongeveer 1 Zilvermeeuw op 3 Kleine Mantelmeeuwen) worden, behalve voor de berekeningen van het aantal broedpaar uit de gegevens van de raaitelling, ook gebruikt om het totaal aantal jonge bruine meeuwen aan het eind van het seizoen het broedseizoen “op soort te brengen”.

Vroeger dan verwacht

Door het warme en droge voorjaar zijn de grote meeuwen dit jaar eerder met broeden begonnen. Tijdens raaiertellingen worden we verrast op een groot aantal uitgekomen pullen die soms zelfs al aan de wandel waren. Deze hebben we zo goed mogelijk meegeteld in hun oorspronkelijke nest, maar we zullen vast een aantal nesten over het hoofd hebben gezien daar pullen zich een stuk beter verstoppen dan eieren.

Zilvermeeuw

Aantal broedpaar 2025: 956


Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Raai telling van de gemengde kolonies, luchtelling om verhouding te bepalen

Deel broedpopulatie NL: 3%

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Broedsucces: 0,12 jong per paar



Berekend aantal broedpaar Zilvermeeuw in de gemengde kolonies.



Zilvermeeuw op de washover

Kleine Mantelmeeuw

Aantal broedpaar 2025: 2649

Broedcode: 16 (Nest met jongen)


Methode: Raai telling van de gemengde kolonies, luchtelling om verhouding te bepalen

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee

Deel broedpopulatie NL: 4%

Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Broedsucces: 0,12 jong per paar




Berekend aantal broedpaar Kleine Mantelmeeuw in de gemengde kolonies.



Kleine mantelmeeuw in de vlucht

Reproductie

Begin Augustus verzamelen de meeste vliegvlugge meeuwen zich op het strand. Omdat de dan nog weinig subadulte meeuwen op het eiland zijn is dat een uitstekend moment op een indruk te krijgen van het broedsucces. Wij telden 452 jonge bruine meeuwen langs het strand en de geulen. In de kolonies valt op dat moment geen overzicht te vergaren wegens de hoogte van de begroeiing. Overigens bepaalden de vogelwachters in 2016 met behulp van enclosures een drie maal hoger broedsucces dan hetgeen ze via de bruine meeuwen strandtelling hadden berekend.



Grote Mantelmeeuw

Aantal broedpaar 2025: 1

Broedcode: 16 (Nest met jongen)


Methode: Sovon-territoriumkartering

Rode lijst: Gevoelig

Deel broedpopulatie NL: 1 %

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Broedsucces: 3 jongen per paar



Op het begroeide gedeelte van het Noordrif heeft dit jaar de Grote Mantelmeeuw met succes een drietal jongen groot gebracht. We treffen de kuikens als jonge pullen en later als halfwas (maar nog net niet vliegvlug) jongen.



Jonge pul van de Grote Mantelmeeuw.

Grote Stern

Aantal broedpaar 2025: 0


Broedcode: 5 (Parend)

Methode: Nesten tellen

Rode lijst: Kwetsbaar

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee

Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



We krijgen in twee periodes gedurende slechts een paar dagen bezoek van groepen Grote Sterns en zien dan baltsende en parende paren. Ze vestigen zich echter niet op Rottumerplaat. Wij denken dat het beesten van Rottumeroog zijn die Rottumerplaat als hub gebruiken.



Opeens veel Grote Sterns op afleesafstand.

Dwergstern

Aantal broedpaar 2025: 18

Broedcode: 15 (Nest met eieren)

Methode: Nesten tellen

Rode lijst: Kwetsbaar


Natura 2000-doelsoort broedvogel voor zowel de Noordzeekustzone als de Waddenzee

Deel broedpopulatie NL: 2 %


Ingepulde nestkaarten (aviNest): 3

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Nestsucces: 0%



Behalve drie nestjes bij de puindammen (die twee dagen later al weer leeggeroofd blijken) vestigt zich een nieuwe kolonie van in ieder geval 15 nesten op de Nieuwe Oostpunt. Deze laatste kolonie verdween met het hoogwater van 23 juni in zijn geheel in de golven.



Dwergsterns probeerden dit jaar meerdere malen eieren uit te broeden op Rottumerplaat.



De sternenkolonie

Ook dit jaar zitten de sternen in hun kolonies gezellig naast elkaar op en rond de puindammen. Bijna alle nesten **Visdief**, **Noordse Stern** en **Dwergstern** zijn individueel gemarkeerd met een op afstand individueel herkenbaar gekleurde tegel. Nadat de nesten waren verlaten zijn ze allemaal ingemeten.



Ligging van de sternennesten rond de Puindammen.

Broedparen Noordse Stern en Visdief werden in het verleden niet apart op soort gebracht. De soorten lijken veel op elkaar. Daarnaast zijn verrekijkers en telescopen er enorm in kwaliteit op vooruitgegaan vergeleken met de beginjaren het vogelwachten op de Rottums. Om toch enig inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van deze soorten een samengestelde grafiek, ontwikkeling van deze soorten een samengestelde grafiek, naast de soortgrafieken met een minder lange geschiedenis.



Sternen (op de foto voornamelijk Visdieven) op Puindam 3. Hun nesten individueel gemerkt met gekleurde en genummerde tegels.

De visdieven delen de afgelopen jaren hun kolonie met een deel van de Kokmeeuwen die op het eiland broeden. Volwassen Kokmeeuwen met nesteldrang bleven dit jaar echter tot laat in het seizoen afwezig. Daarmee werd de Visdief de hoofdbewoner van puindam 3, die net wat hoger ligt dan de andere puindammen. We hebben twee maal per week nieuwe nestjes voorzien van een individueel herkenbare tegel, zodat we een aantal nestjes op afstand de voortgang in de gaten konden houden, maar ook via korte bezoeken aan de kolonie goed overzicht konden verkrijgen. Ook hebben we tijdens onze bezoeken naar nieuwe nestjes bijgehouden wat er in de al wat oudere nestjes gaande was. We constateerden op die manier dat er vanaf het begin meteen gepredeerd werd op de nesten. Met name de Stormmeeuw in de ei-fase, Zilvermeeuw in de kuiken-fase. De Scholeksters met wie de puindam werd gedeeld als nestelplaats zijn ook geen liefhebber van burensnelafstand. Twee maal kwam het tij zo hoog dat er een aantal nestjes leegspoelden.

Visdief

Aantal broedpaar 2025: 105

Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Nesten tellen

Rode lijst: Gevoelig

Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee

Ingevlude nestkaarten (aviNest): 25

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Broedsucces ($n=105$): $< 0,05$ jong per paar



We sluiten niet uit dat veel van de later gestarte nestjes herlegsels betreffen van mislukte nesten. Daarom houden we het aantal broedparen op het aantal nesten dat we in de eerste weken telden. We zagen zo'n 75 kuikens uit eieren kruipen maar zijn medio juni gestopt dit te monitoren. Dit was het moment dat de eerste jongen konden gaan wandelen en ernstig last zouden gaan ondervinden van onze aanwezigheid. Omdat we toen het aantal broedparen al goed hadden ingeschat hebben we de kolonie op dat moment niet meer betreden en dus hebben we slechts een schatting van het totaal aantal gelegde nesten. Uiteindelijk zien we slechts 5 Visdiefjongen opgroeien tot vliegvlug.

Noordse Stern

Aantal broedpaar 2025: 179

Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Nesten tellen

Rode lijst: Bedreigd


Natura 2000-doelsoort broedvogel Waddenzee

Deel broedpopulatie NL: 26 %

Ingevulde nestkaarten (aviNest): 32


In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Broedsucces (n=179): < 0,01 jong per paar



De Noordse Stern broedde dit jaar duidelijk gescheiden van en naast de Visdiefkolonie. Het lager gedeelte van puindam 3, op puindammen 1 en 2 en wat hoger gelegen op de gobimatten op de kop van de puindammen. Eigenlijk was dat alleen op de gobimat op de kop van puindam 3 succesvol. De andere plekken lagen duidelijk in het zicht van de paar nestelende Zilvermeeuwen langs de steile buitenrand van de stuifdijk. Deze

laatste hebben de uitgekomen kuikens in rap tempo als voedsel voor zichzelf en hun eigen kuikens gebruikt. Ook lagen de Noordse Stern nestjes wat verder uit elkaar dan de Visdief nesten, dus bij de verdediging van hun eieren waren de ouders net wat meer op zichzelf aangewezen, zo leek. Op basis van gekleurde ouders konden we herlegsels vaststellen, dus ook hier hebben we er voor gekozen na half juni te stoppen om nieuwe nesten als extra broedpaar te tellen. We zien 50 kuikens uit hun ei kruipen, maar het ene vliegvlug jong dat we zien is waarschijnlijk de enige overgeblevene.



Noordse Stern op de eieren.



En deze is net uit het ei.


Holenduif

Aantal broedpaar 2025: 2


Broedcode: 6 (Mogelijke nestlocatie)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Nadat de Holenduif begin deze eeuw leek te verdwijnen als broedvogel van het eiland, is het de laatste jaren weer een vaste bewoner van de vele konijnenholen. Dit jaar liet de Holenduif zich regelmatig in paartjes zien zowel aan het begin als het eind van het Middenbos.




Houtduif

Aantal broedpaar 2025: 3


Broedcode: 6 (Mogelijke nestlocatie)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Begin deze eeuw broedden op Rottumerplaat meerdere paren Houtduif. Na 2004 verdween de broedvogel van het eiland, volgens de uitgave Fauna van Rottum bestaat er een correlatie met de regelmatig aanwezige Havik vanaf 2005. Inmiddels worden weer regelmatig broedende Houtduiven op het eiland aangetroffen. Niet toevallig: volgens de vogelwachters-rapportages is de Havik sinds 2012 een minder regelmatige gast. Dit jaar past met één langstreckende Havik en drie broedparen Houtduif dat beeld.



Koekoek


Aantal broedpaar 2025: 1

Broedcode: 12 (uitgevlogen jong)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Rode lijst: Kwetsbaar

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Koekoek broedt door de jaren heen vaker niet dan wel op Rottumerplaat. Op die zin valt uiteraard nogal wat af te dingen aangezien de Koekoek helemaal nooit broedt, maar dat overlaat aan een waardvogel. Dit jaar liet de soort zich horen en zien, en met ruim een maand later een vervolgwarneming van een jong exemplaar in gezelschap van een Graspieper als vermoedelijke waardvogel lijkt het waarschijnlijk dat dit een hier uitgebroed jong betreft.



Koekoeksjong aan het einde van het broedseizoen.

Veldleeuwerik


Aantal broedpaar 2025: 76

Broedcode: 2 (Zingend individu in geschikt broedbiotoop)


Methode: Sovon-territoriumkartering

Rode lijst: Gevoelig

Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Veldleeuwerik is een moeilijk te tellen soort. Of de omhoogschietende zingende exemplaren nu reeds geteld waren of niet blijft ingewikkeld inschatten. Of de enorme aantallen van 2022 en 2023 nou een uitschieter waren van de soort of van de tellers blijft onbeantwoord, maar die twee jaar buiten beschouwing latend zit het aantal broedparen weer netjes op lijn met de gestage groei die de afgelopen jaren plaatsvindt op Rottumerplaat. Dit lijkt in pas te lopen met de gestage groei van het oppervlakte van het Noordrif, de plek op het eiland waar de dichtheid van de Veldleeuwerik al jaren het hoogst is.




Oeverzwaluw

Aantal broedpaar 2025: 79


Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Tellen van bewoonde nestholen

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Oeverzwaluwen lijken zich steeds beter thuis te voelen op Rottumerplaat. Verzakkingen aan de noordzijde van de stuifdijk vormen op meerdere plekken ideale wandjes waarin de Oeverzwaluwen zelf hun nestholen uitgraven. Een tweetal ondiepe nestjes op de kop van de stuifdijk werden niet in gebruik genomen, zoals net iets meer dan de helft van alle graafpogingen niet werd doorgezet. Op een vijftal wandjes waren dit jaar meerdere nesten wel behuist. Recente graafsporen, afwezigheid van (volgestoven) spinnenwebben, afdoende diepte zijn indicaties van gebruik. Bij langduriger observatie van grotere afstand kan ook het in en uitvliegen van zwaluwen worden waargenomen.



Ligging van de Oeverzwaluwnesten op walletjes die zijn ontstaan door instortingen van de stuifdijkwand.

Boerenzwaluw

Aantal broedpaar 2025: 4

Broedcode: 16 (Nest met jongen)


Methode: Controle van kunstnesten rond de bebouwing

Rode lijst: Gevoelig

Nestsucces: 50%

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Broedsucces (n=4): 2 jong per paar



Met strandzand is het lastig metselen, dus de Boerenzwaluw is op Rottumerplaat voornamelijk aangewezen op de kunstnesten die aan de behuizing zijn geplaatst. Deze zijn in 2015 geplaatst, waarmee de stijging in het aantal broedparen sindsdien is verklaard. Dit jaar werden drie van die nestjes gebruikt, twee daarvan brachten ieder met succes 4 jongen groot. De Boerenzwaluwen die een nestje begonnen in de nok van de Romneyloods zaten lekker droog, maar helaas tijdens de warmste dagen ook verstikkend heet. Die jonkies vonden we uitgedroogd onder het nestje.



Jonge

Boerenzwaluw poseert op een paaltje voor het raam.

Graspieper


Aantal broedpaar 2025: 62

Broedcode: 16 (Nest met eieren)

Methode: Sovon-territoriumkartering


Rode lijst: Gevoelig

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Echt het hele seizoen overal Graspiepers.

De Graspieper laat zich tijdens het broedseizoen op Rottumerplaat vooral zien op de wat oudere gedeelten van de kwelders. Het areaal daarvan neemt langzaam wat af de laatste jaren maar dat zien we nog niet terug in het aantal broedparen. We vinden één nestje, maar het zijn vooral het grote aantal ouders met voedsel op weg naar hun jongen die verklappen wanneer de eitjes zijn uitgebroed.




Witte Kwikstaart

Aantal broedpaar 2025: 8


Broedcode: 16 (nest met jongen)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Witte Kwikstaart broedt jaarlijks op Rottumerplaat. Ook dit jaar is daar geen uitzondering op. Met een nestje in het oude pishok kunnen we de jonkies van dichtbij zien opgroeien. De bijbehorende stippenkaart lijkt slechts twee territoria rond de behuizing aan te geven, maar meer ingezoomd toont die er meer. En anders herinneren de vele jongen die vanaf juni overal rond de behuizing rondhangen ons er wel aan.



Witte Kwikstaarten broeden dichterbij bij elkaar dan de kaart aankan.

Gele Kwikstaart


Aantal broedpaar 2025: 0

Broedcode: 1 (Volwassen individu)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Rode lijst: Gevoelig

Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Gele Kwikstaart laat zich in meerdere varianten (ook Engelse en Noordse) zien in de trektijd. We zien ze onderlangs de stuifdijk en op de Noordkwelder tussen het zeekraal. Hoogstwaarschijnlijk trekkers en ook nog eens in ongeschikt broedbiotoop.


Winterkoning

Aantal broedpaar 2025: 2

Broedcode: 14 (Voedseltransport)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Winterkoning wordt al langere tijd als broedgeval op Rottumerplaat waargenomen, al bleef het aantal meestal tot één beperkt, met uitschieters in 2019 en 2023. Dit jaar laat hij zich horen en zien bij de behuizing en in de bosschages verderop langs de stuifdijk.


Heggenmus

Aantal broedpaar 2025: 14

Broedcode: 2 (Zingend)


Methode: Sovon-territoriumkartering

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Sinds de Heggenmus zich in 2013 vestigde als broedvogel op Rottumerplaat duurde het nog zo'n 15 jaar totdat de aantallen begonnen toe te

nemen. De laatste jaren lijkt er echt een groei te zitten in het aantal broedgevallen en is hij eigenlijk continue en overal langs de stuifdijk te horen.




Roodborst

Aantal broedpaar 2025: 1


Broedcode: 14 (Voedseltransport)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Eerste broedgeval op Rottumerplaat.



Met slechts een beperkt aantal waarneming aan het begin van het seizoen leek het voorkomen van de Roodborst in bijna alles op de jaren waarin vogelwachters de aanwezige beesten als trekkers beoordeelden. De waarneming van voedseltransport eind april laat de balans anders doorslaan en we noteren het eerste broedgeval op Rottumerplaat.




Blauwborst

Aantal broedpaar 2025: 0

Methode: Sovon-territoriumkartering

Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Blauwborst heeft zich dit hele seizoen niet laten zien of horen op Rottumerplaat.

Nachtegaal


Aantal broedpaar 2025: 1

Broedcode: 2 (Zingend)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Rode lijst: Kwetsbaar

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Nadat we ruim een week hebben mogen genieten van de zang van de Nachtegaal vonden we een volwassen exemplaar die zich te pletter had gevlogen tegen een raam van de bebouwing. 5 weken later gedurende twee dagen zachte korte roepjes rond de behuizing en weer twee weken later zien we een jonge vogels. De wens lijkt hier vader van de gedachte dat dit zou duiden op een geslaagd éénouder nestje.


Zwarte Roodstaart

Aantal broedpaar 2025: 1

Broedcode: 14 (Voedseltransport)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Anders dan de afgelopen seizoenen, waarbij de vraag boven de markt bleef hangen of de roodstaarten nou op het eiland hadden gebroed, is de Zwarte Roodstaart gedurende het hele broedseizoen regelmatig waargenomen. Een waarneming van voedseltransport gaf de doorslag om hem te tellen als broedvogel in 2025.

Tapuit

Aantal broedpaar 2025: 2-3


Broedcode: 14 (Voedseltransport)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Rode lijst: Bedreigd

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.

Broedsucces (n=2): 3 jongen per paar




Aan het westelijke uiteinde van de vallei op de stuifdijk, tussen knik twee en drie, zien we al vrij vroeg soms één soms twee paartjes Tapuit rondhangen. Ze vliegen veel rond en door elkaars territorium dus onderscheiden wie van welk paar is blijft een uitdaging. Gedurende het seizoen noteren we van beide paren eerst alarmroepjes, later ook voedseltransport. Uiteindelijk zien we twee paren en met ieder 3 jongen tegelijkertijd de vallei bevolken.

Meer dan een maand later zien we op ongeveer dezelfde plek een vrouwtje alarmerend en met voedsel aan de sjouw. Dat kan zowel duiden op een herlegsel als een derde broedpaar.




Eén van de jonge Tapuiten die dit werden geboren.



Merel


Aantal broedpaar 2025: 2
 Broedcode: 7 (Alarmerend)
 Methode: Sovon-territoriumkartering
 In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.




Merelzang, tijdens meerdere telrondes, bij de behuizing duiden op een broedpaar. Eénmaal een alarmerend exemplaar verderop langs de stuifdijk. Of was dat zijn laatste angstkreet? We vinden daags daarna op dezelfde locatie veren van een vers geplukt exemplaar.

Zwartkop

Aantal broedpaar 2025: 2
 Autoclustering Sovon: 4
 Broedcode: 2 (Zingend)
 Methode: Sovon-territoriumkartering
 Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Zwartkop is regelmatig zingend rond de behuizing en het begin van de stuifdijk, en daarmee stellen we een tweetal territoria vast. Een tweetal waarnemingen van verschillende zingende beesten in het voorjaar worden door de autoclustering ook aangemerkt als broedpaar maar wegens het ontbreken van vervolgwarnemingen op die plek door ons ingeschat als beesten op trek.



Twee paartjes Zwartkop dit jaar

Tuinfluiter


Aantal broedpaar 2025: 0

Autoclustering Sovon: 1

Broedcode: 2 (Zingend)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Slechts één waarneming van een zingend exemplaar op 13 mei, en omdat de Tuinfluiter nog tot diep in die maand kan doortrekken kiezen wij er voor deze niet als broedgeval te tellen.


Grasmus

Aantal broedpaar 2025: 9

Broedcode: 14 (Voedseltransport)


Methode: Sovon-territoriumkartering

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Grasmus in de liguster.

De Grasmus is een mooi voorbeeld van een soort die met het ouder worden van de bomen en struiken langs de stuifdijk wel opeens 'overal kan broeden'. We zien maar vooral horen drie paar rond het huis, en verderop de stuifdijk stellen we nog 6 territoria vast. Later in het seizoen horen we veelvuldig alarmroepjes en zien aan het einde van het seizoen een ouder met voedsel in de weer.




Braamsluiper

Aantal broedpaar 2025: 4


Broedcode: 2 (Zingend)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Weinig zichtwaarnemingen van deze stiekemer, maar hij laat veelvuldig van zich horen. Zowel bij de behuizing als verderop de stuifdijk.




Sprinkhaanzanger

Aantal broedpaar 2025: 1

Broedcode: 2 (Zingend)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Net voorbij de laatste paal van de vlinderroute heeft eind mei en begin juni de Sprinkhaanzanger een hele duindoornvlakte voor zichzelf. Althans, die indruk maakt ie met zijn continue trilgeluidje. Niet alleen vanuit de duindoorns maar het liefst van bovenop het hoogste topje is de Sprinkhaanzanger te horen en daarbij ook mooi zien.

Rietzanger


Aantal broedpaar 2025: 1

Broedcode: 2 (Zingend)


Methode: Sovon-territoriumkartering

Voor het eerste jaar zonder twijfel een

Rietzangerterritorium op Rottumerplaat.



In voorgaande jaren is door de vogelwachters besloten een enkele waarneming niet te tellen als broedgeval. Dit jaar gaat het om waarnemingen van zang op verschillende data in juni, telkens op dezelfde plek. In geschikt broedbiotoop, op vergelijkbare plekken op de andere Waddeneilanden broedt de Rietzanger. Daarmee het eerste geval van een broedterritorium op Rottumerplaat.




Spotvogel

Aantal broedpaar 2025: 2

Broedcode: 2 (Zingend)

Methode: Sovon-territoriumkartering

Eerste vastgestelde territoria op Rottumerplaat



Na zingende vogels in 1990, 1992 en 2024 die als langstreckende bezoekers werden beoordeeld nu voor het eerst wel een tweetal vastgestelde territoria. Op beide plekken bleven ze in zowel mei als juni enthousiast en veelvuldig hoorbaar aanwezig.

Kleine Karekiet


Aantal broedpaar 2025: 0

Autoclustering Sovon: 1


Broedcode: 2 (Zingend)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Net als alle eerdere waarnemingen van Kleine Karekieten deze eeuw beoordelen we slechts summiere zang zonder vervolgwaarnemingen op die plek als bezoek tijdens de vogeltrek.



Bosrietzanger


Aantal broedpaar 2025: 0

Autoclustering Sovon: 1

Broedcode: 2 (Zingend)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Vanwege gebrek aan vervolgwaarnemingen en de mogelijkheid van doortrek tot in juni zijn we van mening dat deze waarneming te mager is om uit te gaan van een broedgeval.


Fitis

Aantal broedpaar 2025: 2

Broedcode: 2 (Zingend)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Afgelopen jaren bezorgen zingende Fitissen tot wisselende interpretatie bij de vogelwachters. Omdat zowel bij de behuizing als bij het Middenbos twee weken later sprake was van een

herhaalwaarneming tellen wij ze beide wel als broedgeval.


Tjiftjaf

Aantal broedpaar 2025: 6


Broedcode: 2 (Zingend)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Op basis van het aantal zingende Tjiffen tijdens de inventarisatierondes komt de autoclustering op 6 territoria op en langs de stuifdijk. We zien één jong exemplaar bij de behuizing op het moment dat we net een mogelijke Iberische Tjiftjaf tot zingen proberen te verleiden.




Ekster

Aantal broedpaar 2025: 0

Niet waargenomen dit jaar

Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



De Ekster heeft zich dit seizoen helemaal niet laten zien. De afgelopen vier jaar broedden ze hier al niet meer, maar brachten ze ten minste nog wel even een bezoekje aan het eiland.


Kauw

Aantal broedpaar 2025: 7

Broedcode: 16 (Nest met jongen)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Kauwtjes broeden in konijnenholen op Rottumerplaat. Veel daarvan zitten in de stuifdijk, maar ook in de lagere duintjes weten de Kauwtjes die te vinden. Tijdens een van de inventarisatierondes vinden we een krijsend konijnenhol in de meeuwenkolonie. Er blijken

drie jonge Kauwtjes in te zitten. Het filmpje dat we daar van maken wordt erg gewaardeerd door de volgers op ons instagramaccount.

Zwarte Kraai

Aantal broedpaar 2025: 7

Broedcode: 16 (Nest met jongen)


Methode: Nesten tellen

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.


Ingevulde nestkaarten (aviNest): 7

Nestsucces (n=7): 88%

Broedsucces: 1,9-2,1 jongen per paar



De Zwarte Kraai maakte begin deze eeuw een duidelijke groei door op Rottumerplaat. Om alle nesten op het vizier te krijgen is reeds in de periode voordat er blad aan de bomen kwam een ronde gemaakt om de oude nesten te lokaliseren. Niet al die plekken bleken gebruikt te gaan worden. 7 nesten werden uiteindelijk bezet met in totaal 31 eieren en later 18 jongen.




Spreeuw


Aantal broedpaar 2025: 0

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Hoewel de gewekte indruk dat de Spreeuw vorig jaar een nieuwkomer zou zijn bij nader inzien niet waar bleek, heeft dat broedgeval dit jaar geen vervolg gekregen.



Wel aanwezig, maar niet op territoriaal gedrag of iets met eieren kunnen betrappen. Het jong op de foto kan ook goed van een ander eiland hierheen zijn gevlogen.

Wielewaal


Aantal broedpaar 2025: 0

Autoclustering Sovon: 1

Broedcode: 7 (Zang)

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.




Met slechts wat bomen en kleine struiken ontbreekt echt geschikt broedbiotoop. Daarnaast hebben wij de vogel maar 1 maal horen zingen, dus concluderen wij dat deze hier niet heeft gebroed.

Vink

Aantal broedpaar 2025: 0

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Het is geen geweldig druk Vinkenjaar dit seizoen op Rottumerplaat. Nauwelijks waarnemingen in aanloop naar en tijdens het broedseizoen.

Kneu


Aantal broedpaar 2025: 14

Broedcode: 16 (Nest met jongen)


Methode: Sovon-territoriumkartering

Ingevlde nestkaarten (aviNest): 1

Meer dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Als je wel voet op het eiland zou kunnen zetten, maar niet verder mag dan de bebouwing (hetgeen voor sommig bezoek hier geldt) zou je haast denken dat de Kneu de hoofdbewoner van het eiland is. We tellen alleen rond de behuizing al zes territoria. Je hoort en ziet ze de hele tijd. Verderop langs de stuifdijk zitten ze ook volop, maar zo veel als tijdens het wakker worden hier ga je er daar niet meer treffen.




Groenling

Aantal broedpaar 2025: 0

Methode: Sovon-territoriumkartering

In lijn met het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



We zien geen enkele Groenling dit seizoen op Rottumerplaat.


Rietgors

Aantal broedpaar 2025: 0

Autoclustering Sovon: 3

Methode: Sovon-territoriumkartering

Minder dan het gemiddelde aantal de afgelopen 5 jaar.



Met in het hele seizoen slechts één waarneming is de Rietgors de mysterieuze afwezige op het eiland dit jaar. Pas tegen de datumgrens zien we er wat meer, maar ook die blijven zoals verwacht niet plakken.

5.3 Hoogwater-vluchtplaatstellingen

Gedurende het vogelwachterseizoen van 2025 zijn acht hoogwater-vluchtplaatstellingen uitgevoerd, de eerste op 19 april, de laatste op 26 juli. De tellingen van 19-4, 17-5, 12-7 waren integrale tellingen voor SOVON. 14-6 betrof een steekproeftelling voor SOVON en die van 3-5, 31-5, 29-6 en 26-7 waren extra tellingen waarin de reeds ruim 50 jaar lange reeks van Staatbosbeheer wordt doorgezet.

Er is gekozen om de extra telling van 5-4 over te slaan; we zagen op 4-4 bij onze eerste ganzentelronde dat er al eerste kuikens uit het ei waren. De keuze is gemaakt om de dagen erna eerst de ganzentelling op het hele eiland af te maken.

Tijdens de tellingen zijn de roofvogels, wadvogels en watervogels geteld. Voor de Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen is afgesproken om ze niet mee te tellen als ze zich in of bij de kolonies begaven. De tellingen van gebieden Noord en Zuid zijn steeds op de website van SOVON ingevoerd. De data die wij presenteren zijn de totalen van deze 2 tellingen opgeteld.

Methode hoogwater-vluchtplaatstellingen

Rottumerplaat is voor de hoogwater-vluchtplaatstellingen (HVP telling) opgedeeld in twee deelgebieden, deelgebied Noord (WG3310) en deelgebied Zuid (WG3320) en worden gelijktijdig met, in ieder geval, Rottumeroog uitgevoerd. De HVP-tellingen buiten het broedseizoen worden uitgevoerd door een telploeg van 4 personen. Tijdens het broedseizoen zijn er

steeds 2 vaste tellers. Dit maakt dat we keuzes moesten maken over waar we wél en waar we niet kwamen tijdens de telling. Wij hebben er voor gekozen 2 uur voor hoogwater te starten.

Teller 1 start tellen vanaf de uitkijktoren naar Zuid (WG3320). Deze teller telt de Boschplaat (tegenlicht), het Zuidwesterduin en het hele wad en Westgeul.

De Oostgeul is de grens tussen gebied Zuid en Noord.

Teller 2 telt Noord (WG3310); Vanaf het hoge bankje/de trektelpost Oostplaat, Oostgeul en Noordkwelder, Oude Oostpunt en Nieuwe Oostpunt.

Als het bijna hoogwater is, lopen we gezamenlijk de stuifdijk af en tellen we vooral bij de grote slenk, plasjes in de Zuidkwelder en de wash-over (Zuid) en de Oostgeul, Komma, PC-plein en Noordplas en de wash-over (allen Noord).

We lopen dan dus nog even met het tij mee, waardoor we zicht hebben op welke al getelde beesten doorschuiven op het eiland op. Ook overleggen we ter plaatse welke overvliegende vogels bij Noord of Zuid worden weggeschreven.

Op 29 juni heeft Rik meegeteld, als plaats vervanger van Marcel die afwezig was.

Resultaten hoogwatertellingen

In de tabel staan de resultaten van de 8 uitgevoerde hoogwatertellingen.

In totaal zijn er ruim 130 duizend vogels geteld. Meest getelde vogel was de Bonte Strandloper, gevolgd door zowel de Wulp als de Kokmeeuw met ongeveer gelijke aantallen. De laatste telling was de drukste. Het is dan nog niet eens op zijn drukst, want die zit aan het begin van de najaarstrek. In de tellingen daarna is het allemaal nog veel drukker.


Hoogwatervluchtplaatstellingen tijdens het vogelwacherseizoen 2025	april	mei	mei	mei	juni	juni	juli	juli
datum	19-4-2025	3-5-2025	17-5-2025	31-5-2025	15-6-2025	29-6-2025	12-7-2025	26-7-2025
waterstand (cm+NAP)	102	126	106	116	123	163	127	142
wind (Bft)	4	4	4	2	3	3	3	2
Grote Canadese Gans	0	0	0	180	8	0	0	0
Rotgans <i>Natura 2000</i>	420	445	686	110	1	1	0	0
Brandgans <i>Natura 2000</i>	33	70	0	12	2	6	0	0
Grauwe Gans <i>Natura 2000</i>	220	0	0	19	7	24	0	4
Nijlgans	10	4	0	0	6	2	0	0
Bergeend <i>Natura 2000</i>	231	236	163	148	281	606	230	120
Zomertaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Slobeend <i>Natura 2000</i>	2	1	0	0	0	0	0	0
Smient <i>Natura 2000</i>	2	0	0	0	0	0	0	0
Wilde Eend <i>Natura 2000</i>	14	9	0	0	0	3	0	0
Pijlstaart <i>Natura 2000</i>	69	0	0	0	0	0	0	0
Wintertaling <i>Natura 2000</i>	12	3	0	0	0	0	0	0
Eider <i>Natura 2000</i>	1.184	1.691	942	2.450	2.665	1.720	557	1668
Zwarte Zee-eend	0	0	0	70	35	40	0	0
Lepelaar <i>Natura 2000</i>	83	25	1	39	0	51	16	0
Blauwe Reiger	0	0	0	0	1	0	0	2
Aalscholver <i>Natura 2000</i>	34	40	2	16	8	9	5	17
Sperwer	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruine Kiekendief <i>Natura 2000</i>	10	10	12	8	10	8	2	10
Blauwe Kiekendief <i>Natura 2000</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Torenvalk	0	0	0	0	0	0	0	0
Slechtvalk <i>Natura 2000</i>	4	4	1	2	1	0	0	1
Velduil <i>Natura 2000</i>	1	0	0	0	0	0	0	0
Zeearend	1	0	0	0	0	0	0	1
Ruigpootbuizerd	0	0	0	0	0	0	0	0
Buizerd	4	4	4	2	1	4	0	0
Waterral	2	0	0	0	0	0	0	0
Scholekster <i>Natura 2000</i>	910	720	595	524	712	1.030	1.198	4218
Zilverplevier <i>Natura 2000</i>	550	431	97	16	0	0	4	624
Goudplevier <i>Natura 2000</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontbekplevier <i>Natura 2000</i>	8	126	250	567	94	6	6	30
Regenwulp	4	12	7	0	1	2	11	40
Wulp <i>Natura 2000</i>	1.305	174	2	160	401	1.928	6.670	11790
Rosse Grutto <i>Natura 2000</i>	1	11	0	17	1	0	360	2600
Steenloper <i>Natura 2000</i>	150	38	3	3	14	0	8	210
Kanoet <i>Natura 2000</i>	0	6	1.600	4	2	0	52	1250
Kemphaan <i>Natura 2000</i>	0	0	0	57	0	0	0	0
Drieteenstrandloper <i>Natura 2000</i>	0	30	0	0	0	0	0	1
Bonte Strandloper <i>Natura 2000</i>	15.550	4.180	180	200	50	40	404	16600
Oeverloper	0	3	0	0	0	0	1	6
Witgat	0	0	0	0	0	0	0	0
Tureluur <i>Natura 2000</i>	224	92	21	21	2	0	153	490
Zwarte Ruiter <i>Natura 2000</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenpootruiter <i>Natura 2000</i>	12	39	27	0	0	5	5	30
Kokmeeuw	160	113	260	346	765	4.121	8.620	11500
Zwartkopmeeuw	0	2	0	4	3	1	0	0
Stormmeeuw	245	67	230	300	450	102	910	500
Stormmeeuw subsp. Heidei	1	0	0	0	0	0	0	0
Grote Mantelmeeuw	3	7	0	9	0	0	0	10
Kleine Mantelmeeuw <i>Natura 2000</i>	94	260	2	100	52		90	51
Zilvermeeuw	110	180	5	100	37		85	103
Grote Stern <i>Natura 2000</i>	10	4	0	14	153	620	34	10
Dwergstern <i>Natura 2000</i>	4	2	2	4	0	0	0	0
Noordse Stern <i>Natura 2000</i>	0	110	90	200	25		280	80
Visdief <i>Natura 2000</i>	12	122	62	200	35	20	240	100
Zwarte Stern <i>Natura 2000</i>	0	1	0	0	0	0	57	8
Kluut <i>Natura 2000</i>	0	0	0	0	2	0	0	5
Krombekstrandloper <i>Natura 2000</i>	0	0	0	0	0	0	0	5
Witvleugelstern	0	0	0	0	0	0	1	0
Totaal	21.689	9.272	5.244	5.902	5.525	10.349	19999	52084

6. Zoogdieren

Op en rond Rottumerplaat komt een beperkt aantal soorten zoogdieren voor. Gewone zeehonden en konijnen zijn gedurende de gehele periode dagelijks gezien. Naast de twee algemene soorten zijn er ook een aantal waarnemingen gedaan van andere zoogdieren.

6.1 Gewone Zeehond


De Oostpunt en het Schild worden door gewone zeehonden van mei tot juli gebruikt om hun pups te werpen en later in augustus om te verharen. Hoewel de vogelwachters zelf geen telling hebben uitgevoerd konden dagelijks tientallen tot een paar honderd zeehonden gezien worden rond het eiland. De tellingen van gewone zeehonden in de Waddenzee worden jaarlijks internationaal tussen Nederland, Duitsland en Denemarken gecoördineerd en gerapporteerd. Door Wageningen Marine Research worden jaarlijks de integrale zeehondentellingen uitgevoerd in de Nederlandse Waddenzee. Deze tellingen worden uitgevoerd vanuit een vliegtuig foto's te maken en deze later te analyseren. Het tellen van de gewone zeehondenpopulatie vindt op twee momenten plaats; tijdens de geboorteperiode (mei-juli) en wanneer de dieren verharen (augustus). Rottumerplaat valt binnen telgebied 8. Tijdens het schrijven van dit rapport kwamen de gegevens van de tellingen van 2024 beschikbaar, de cijfers van 2025 laten op zich wachten.



Verdeling van de Nederlandse Waddenzee in 13 telgebieden, waarbij Rottumerplaat valt onder telgebied 8

De populatiegrootte van gewone zeehonden in Nederland, maar ook in de internationale Waddenzee, nam tot 2012 toe en blijkt sindsdien ongeveer gelijk te blijven (Brasseur et al. 2018).


Voor 2024 werd de populatie gewone zeehonden rond de Rottums (telgebied 8) geschat op 593 exemplaren.



Aantallen gewone zeehonden in telgebied 8 en in de hele Nederlandse Waddenzee

6.2 Grijze zeehond

Naast de gewone zeehond wordt ook de grijze zeehond per vliegtuig geteld in de internationale Waddenzee. Grijze zeehonden worden in twee perioden geteld: tijdens de geboorteperiode (december) en wanneer de dieren verharen (maart/april). Grijze zeehonden worden niet overal op het Nederlandse wad evenveel gezien. Veruit de meeste zijn er in het gebied tussen Vlieland en Terschelling. In telgebied 8 (de Rottums) werden vorig jaar 32 grijze zeehonden geteld. Lijkt weinig maar vergeleken met de jaren ervoor een enorm aantal. Van 2008 tot 2021 is hier alleen in 2017 één grijze zeehond gezien.



Aantallen grijze zeehonden in telgebied 8 en in de hele Nederlandse Waddenzee

Strandingen zeehonden

Op 30 juli lag er een grijze zeehond met een net verstrikt om haar nek op de vloedlijn van het Noordzeestrand, even ten noorden van het PC plein. Na overleg met de Harder is een reddingsactie opgezet in samenwerking met WEC Waddenzee en de KNRM Eemshaven. Die avond bleek de branding toch te heftig om aan te landen op het eiland. Er is toen direct besloten het de volgende dag nogmaals te proberen met de Harder. Omdat de vogelwachters de betreffende zeehond die ochtend niet meer aantreffen is die twee poging afgeblazen.



Grijze zeehond verstrikt in visnet

Daarnaast zijn dit seizoen in totaal maar zes dode zeehonden op het eiland gevonden, waarvan één grijze zeehond. Ook waren er een viertal korte ontmoetingen met huilers in de maand juni, die bleken een dag later weer verdwenen.



Huiler van de Gewone Zeehond

6.3 Bruinvissen

We vonden de resten een onduidelijk aantal (4 tot 5) Bruinvissen. Blijft een moeilijke puzzel, dus wellicht is de vondst van drie schedels het duidelijkst. Gedurende het vogelwachtseizoen zijn er door ons geen levende Bruinvissen waargenomen in de zee rond Rottumerplaat. Wel hoorden we van een tweetal waarnemingen door de bemanning van de Harder.



Dode Bruinvis op het strand

6.4 Konijnen

Het is niet helemaal duidelijk hoe konijnen op Rottumerplaat terecht zijn gekomen. Op Rottumeroog zijn konijnen uitgezet als voedselvoorziening voor de voogd (Toxopeus, 2010). Zeer waarschijnlijk zijn op Rottumerplaat om dezelfde reden als Rottumeroog konijnen uitgezet, namelijk als voedselvoorziening voor de werklieden van Rijkswaterstaat (Zekhuis & de Vries, 2012). Sinds de jaren 90 wordt op de Rottums niet meer op konijnen gejaagd. Konijnen zijn om verschillende redenen van belang voor de biodiversiteit op het eiland. Door hun begrazing hebben ze invloed op de vegetatie. Op kort begraaide delen groeien andere plantensoorten dan op verruigde delen. Konijnenholen vormen een belangrijke

broedgelegenheid voor vogels, zoals Bergeend, Tapuit, Kauw en Holenduif. Als laatste vormen de konijnen ook een belangrijke voedselbron voor de roofvogels op het eiland. In de nesten van Buizerds en Bruine Kiekendieven liggen veel restanten van konijnen. Ook in het veld zijn veel dode prooidieren gevonden.

Een afname van het aantal konijnen kan een groot effect sorteren op de biodiversiteit. Het is echter niet bekend of het aantal konijnen op het eiland toe- of afneemt. Om de trend te volgen, startten de vogelwachters van 2019 een konijnenmonitoring. De ambitie is om deze monitoring jarenlang te herhalen, zodat na verloop van tijd een trend is te ontdekken.



Traject konijntelling


Tijdens een vaste route van 1,7 kilometer, werd meerdere keren tijdens het vogelwachtersseizoen met een vaste methodiek het aantal konijnen geteld. De route loopt aan de voet van de Stuifdijk vanaf het einde van de Gobimatten (net voorbij de Behuizing) tot aan paal 20 van de vlinderroute. Tijdens het lopen van deze route zijn alle konijnen aan de rechterzijde geteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt in zwarte konijnen en konijnen met wildkleur. Ook is genoteerd als het jonge konijnen betreft. De route komt deels overeen met route 1 van de vlinderroute.

Konijntelling 2025	13 apr	28 apr	13 mei	28 mei
zwart	18	28	18	13
zandkleurig	15	30	10	19
jong	1	5	0	2

Net als in de vorige jaren werd geconstateerd dat de telling begin juni niet meer representatief was vanwege de hoge vegetatie.

Er wordt pas sinds 2019 op een vergelijkbare manier konijnen geteld. Voor conclusies over

trends is het te vroeg, maar het maximaal aantal getelde beesten per kleur tijdens een telling kan al wel in een grafiekje.



Aantal konijnen

Vanwege de grote invloed van konijnen op de biodiversiteit van Rottumerplaat is het aan te raden om de methodiek in volgende jaren uit te blijven voeren

6.5 Dwergvinvis

Op Rottumerplaat ligt sinds november 2020 een dode Dwergvinvis. De Dwergvinvis is destijds door een garnalenkotter in zee gevonden en door de bemanning van de Harder naar het eiland gebracht. Normaliter wordt in Nederland een kadaver meteen opgeruimd. Anders kan het weer in zee drijven, waar het een gevaar kan vormen voor de scheepvaart. Als pilot is de Dwergvinvis op Rottumerplaat neergelegd, onder meer om te onderzoeken of kadavers de natuur kunnen verrijken. Inmiddels is het onderzoek afgerond en de geur verdwenen. Wat rest is een prachtig skelet.



De restanten van de Dwergvinvis

6.6 Overige zoogdieren

Andere zoogdieren worden hier doorgaans uitsluitend dood aangetroffen. Het betreft dan beesten die ofwel de oversteek van het wad hebben proberen te maken en zijn overvallen door de opkomende vloed, of het zijn beesten die stroomopwaarts in of naast de Eems zijn overleden. Zo werd dit jaar een dode Beverrat aangetroffen bovenop Puindam 2.

Het hert dat aanspoelde op Rottumeroog ging viral met 27.000 views op instagram (@rottumerplaatje)



Reebok, aangespoeld op Rottumeroog. Foto A. Ehrens

7. Insecten

7.1 Dagvlinders

In het kader van het Landelijk Meetnet Vlinders worden op Rottumerplaat gedurende de zomermaanden twee vlinderroutes gelopen. Route 1 bevindt zich onderaan de Stuifdijk en is één kilometer lang. De route is opgedeeld in twintig transecten. Route 2 loopt over de Stuifdijk en is verdeeld in drie transecten.




De 2 transecten van de vlinderroute. In het verslag van 2021 is een vegetatiekartering van deze transecten opgenomen.

De vlinderroutes worden op Rottumerplaat sinds 2000 gelopen. Deze routes hebben hoofdzakelijk als doel de aantalsschommelingen van de Heivlinder te registreren. Het lopen van de vlinderroutes moet tussen 10:00u en 17:00u gebeuren op dagen met een windkracht van minder dan 5 Bft, minder dan 50% bewolking en een temperatuur van minimaal 13 graden Celsius.

Vanwege het mooie droge, warme voorjaar, zijn we al in eind april begonnen met tellen. De vliegtijd van de doelsoort, de Heivlinder, valt echter pas in juli; het geeft een beeld van de dagvlinders en dagactieve nachtvinders die al eerder vliegen.


Van de Heivlinder werden de afgelopen drie jaar maar weinig exemplaren waargenomen. In 2025 werd de eerste Heivlinder op 3 juli waargenomen. Omdat de datum van eerste waarneming in veel vogelwachtersverslagen is terug te vinden geeft een terugblikje in de tijd aan dat de eerste Heivlinder van het seizoen zich gemiddeld steeds iets eerder laat zien.



Historisch overzicht 1^e waarneming Heivlinder

Waarnemingen tijdens de gelopen vlinderroutes

Tijdens de vlindertelling op begin augustus werden er 12 Heivlinders waargenomen op beide transecten samen. Dit is daarmee de telling met de meeste Heivlinders. Ook dat maximale aantal wordt jaarlijks genoteerd.



Overzicht maximale aantallen Heivlinder

De vlinderroute onderaan de Stuifdijk, vergrast en ver-riet de afgelopen jaren. Hierdoor is een deel van de transecten geen biotoop voor de Heivlinder. Dit is, naast het algemene beeld in heel Nederland dat het slecht gaat met de dagvlinders, de reden dat de aantallen laag zijn.



Heivlinder

Naast de tellingen op de vlinderroute zelf, is er geregeld bij de behuizing en tijdens veldwerk gekeken naar de dagvlinders. Meest in het oog springende waarneming was die van een landkaartje; na 2003 en 2009 pas de 3^e waarneming op Rottumerplaat.



Landkaartje

Datum	29 apr	10 mei	13 jun	21 jun	2 jul	13 jul	20 jul	4 aug
Temp	12 °C	13 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	21°C	22 °C
Wind	O 3Bft	NO 2Bft	ZO 2Bft	O 3Bft	W 2Bft	NO 4 Bft	O 3Bft	Z 2Bft
Neerslag	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm
Bewolking	0/8	1/8	sluier	1/8	2/8	2/8	4/8	6/8
Koolwitje spec.	1							
Mi-vlinder	1	1						
St. Jacobsvlinder	1	2	4	2				
Hooibeestje	1	2	1	4	2	2	5	2
Klein koolwitje		1	1	20			4	
Dagpauwoog		1				4	53	
Kleine vos			2	1				
Distelvlinder			2	21				
Icarusblauwtje			1			2	4	7
Gerande goudspanner			3	2				
Gamma-uil			1	19	4	10	2	
Atalanta			18	69	5	8	13	4
Zilverstreepje				1				
Groot koolwitje				6	6	3	5	
Bruin zandoogje					8	43	35	9
Zwartsprietdikkopje						2	3	
Heivlinder						4	9	12
St. Jansvlinder						5	3	2
Citroenvlinder							2	
Kleine vuurvlinder								1

7.2 Nachtvinders

Nachtvinders zijn het gehele seizoen waargenomen; de eerste weken dmv 'stropen' op boomstammen, daarna dagelijks door het plaatsen van een LEDemmer. Ook zijn er veel waarnemingen gedaan van overdag actieve nachtvinders.

Er is geen LEDemmer aanwezig op Rottumerplaat, wat eigenlijk zonde is. Met de privé-emmer die mee was genomen is, is in tegenstelling tot 2024 waarin men gestructureerd met meetpunten van de Vlinderstichting werkte, voor een andere plaatsstrategie gekozen.

De emmer werd op wisselende plekken geplaatst, bij voorkeur in de buurt van planten/struiken die in bloei staan. Zo stond de emmer in het lamsoor, bij een koekoeksbloem in het Kraaienbos, bij Engels gras langs de Oostgeul, bij de vlier op de Stuifdijk, de rimpelroos bij de behuizing, etc. Regen was een reden om de emmer in het oude pishok te plaatsen of in een luwe hoek langs het huis te kiezen.

Alle waarnemingen zijn dagelijks in waarneming.nl geplaatst.

In de bijlages een totaaloverzicht van de waargenomen nachtvinders en/of rupsen van deze categorie. Ook wordt aangegeven hoe vaak ze zijn gevangen, en de totale hoeveelheid van deze soort aangetroffen is.

Determinatiehulp

Voor de determinatie werd de app Obsidentify gebruikt: deze werkt voor de meeste nachtvinders prima (alleen de microvlinders zijn vaak gedetailleerde determinatiekenmerken noodzakelijk)



LEDemmer bij een bloeiende koekoeksbloem



LEDemmer in een veld bloeiende lamsoor

In totaal werden er dit jaar 190 soorten nachtvinders gezien en/of gevangen. Er waren enkele waarnemingen van rupsen.



Heideringelrups

Nieuw op Rottumerplaat

Er werden een 12 soorten nachtvinders voor het eerst op Rottumerplaat waargenomen:

- Bont Schaapje
- Voorjaarsdwergspanner
- Guldenroededwergspanner
- Hopsnuituil
- Kleine Voorjaarsuil
- Margrietooglapmot
- Witte Grasmineermot
- Gauwe Spaandermot
- Getekende Biesbladroller
- Zwartstipbladroller
- Salielichtmot
- Brede w-uil



Bont Schaapje

Tweede vangst op Rottumerplaat

De volgende soorten waren ooit eerder éénmaal gevangen/waargenomen op Rottumerplaat, en dit jaar wederom waargenomen:

- 2^e waarneming Zwart Weeskind
- 2^e vangst Vogelwiekje
- 2^e waarneming Hoornaarvlinder (rups)
- 2^e vangst Zomerbladroller
- 2^e vangst Vlekzandvleugeltje
- 2^e vangst Brandnetelmot
- 2^e vangst Duikermot




Zwart Weeskind

Tweede jaar op Rottumerplaat

Er waren ook twee soorten die al in een eerder jaar, meerdere exemplaren gevangen. Dit jaar het 2^e jaar dat de soort op Rottumerplaat gevangen is:

- na 2006, 2^e jaar Groot Avondrood
- na 2020, 2^e jaar Keizersgalmot



Groot Avondrood

In 2024 nieuw, in 2025 weer gevangen

De volgende soorten werden in 2024 voor het eerst op Rottumerplaat gevangen, en zijn dit jaar opnieuw gevangen:

- Populierengroenuil
- Kraslijnmot
- Kustweidemot
- Donkere Marmeruil
- Kijkgaatje
- Platte Spaandermot
- Kameleonbladroller
- Oranje Granietmot
- Donkergroene Korstmosuil



Populierengroenuil



Bruine Wapendrager



Hermelijnlinder



Bastaardsatijnrups




Kleine Groenuil

7.3 Overige insecten

Zowel tijdens veldwerk rondes, als regelmatig wandelend langs de struiken bij de behuizing, zijn veel insecten gezocht en gefotografeerd. Ook zaten er regelmatig insecten als bijvangst in de LEDemmer.

Met de app Obsidentify op naam gebracht. Het is een 'random-verzameling' van wat er hier zoal loopt en vliegt en pretendeert niet compleet te zijn.

In de bijlagen een overzicht van de overige insecten, gerangschikt per soortgroep zoals deze app en ook waarneming.nl de insecten ordent.



Maskerbij

8. Flora

Rottumerplaat is constant in beweging, van duintjes die ontstaan en verdwijnen tot verzoeting en verzilting van delen van het eiland. Deze veranderingen hebben effect op de planten die voorkomen op het eiland. Jaarlijks geven de vogelwachters een zo compleet mogelijk beeld van de aanwezige plantensoorten. In 2025 leunde deze inventarisatie enerzijds op de app Obsidentify en anderzijds op de kennis en inzet van twee bevriende plantenkenners die 11-14 juli een weekend langskwamen op het eiland.

Dit jaar waargenomen rode lijst soorten:

Blauwe zeedistel
Engels gras
Engels lepelblad
Geelhartje
Kattendoorn
Knopbies
Rode ogentroost
Sierlijke vetmuur
Zeealsem
Zeepostelein
Zeerus
Zeeweegbree

Bijzonder is het voorkomen van een veldje orchideeën aan de noordzijde van de Stuifdijk halverwege Middenbos en derde knik. Op of in de buurt van deze plek is met enige regelmaat melding gemaakt van één of meerdere orchideeën, niet altijd met dezelfde determinatie maar in ieder geval in gestaag oplopend aantal. Onze experts houden het op een hybride van vleeskleurige en gevlekte orchis, maar is ook wel rietorchis of vleeskleurige orchis genoemd. De eerste melding stamt uit 1950. Daarna is er sprake van één exemplaar in 1997, waarschijnlijk wat lager gesitueerd op de dijk dan de huidige locatie. In 2021 vinden ze in totaal 35 exemplaren op de plek waar ze nu ook nog staan. Daar worden ze in 2022 en 2024 ook waargenomen. Dit jaar tellen we 98 exemplaren.



'de' Orchidee

Nieuw was de vondst van twee struiken hondsroos, waarvan er eentje de afgelopen jaren hoogstwaarschijnlijk al verscheen in het lijstjes, toen nog gedetermineerd als egelantier. Laatste bezoek aan de lage kwelder bracht ons de waarneming van een tweetal locaties Zeelant. Een nieuwe soort voor het eiland, en pas de vijfde locatie in Nederland.

Zeegras

Zowel Groot- als Klein zeegras lijkt niet meer aanwezig, de plekken waar ze tot in 2022 werden waargenomen zijn inmiddels wat meer verzand en daardoor wellicht minder geschikt voor zeegras. Zoektochten meer oostelijker en langs de overgang van slik naar zand langs de geul door de Japanse oester bank hebben geen nieuwe locaties opgeleverd.

Rimpelroos


De rimpelroos is een invasieve exoot waarvoor geldt die in duingebied door verschillende beheerders wordt bestreden. De soort komt veelvuldig voor rond de bebouwing en inmiddels ook op drie locaties meer westelijk langs en op de stuifdijk, tussen de Tweede en Derde knik.

9. Aanbevelingen

- Er missen een aantal materialen op Rottumerplaat die hard nodig zijn bij de inventarisatiewerkzaamheden. Zo is er een aantal jaren enthousiast met privé LEDemmers op nachtvlinders geïnventariseerd. Maar voor de standaard meetpunten die we worden geacht te inventariseren is geen materiaal aanwezig. Daarnaast is ook dit jaar weer gebruik gemaakt van een wildcamera om te bepalen welke gekleurde scholleksters op welke nesten broeden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de scholleksterringers, maar wildcamera's zijn niet standaard aanwezig op het eiland.
- Het eiland verandert, een aantal plekken vraagt om een naam. Logische namen die ook door de jaren heen logisch blijven komt de leesbaarheid van de verslagen ten goede. Wij stellen voor: Oude Oostpunt, Nieuwe Oostpunt en Nieuwste Binnenzee.

- De grenzen van het te inventariseren gebied in de BMP module van Sovon zijn al een aantal jaar niet maar aangepast aan de veranderende contouren van het eiland. Met name bij de Nieuwe Oostpunt gaat dit de komende jaren waarnemingen buiten het te inventariseren gebied opleveren. Graag aanpassen!

De rapporten uit de eerdere jaren bevatten een schat van informatie omdat er al ruim 50 jaar intensief wordt geïnventariseerd en gerapporteerd. Stug volhouden, netjes documenteren en gemaakte keuzes toelichten. Zoveel mogelijk volgens de inmiddels netjes vastgelegde methode zodat cijfers door de jaren heen ook vergelijkbaar zijn.



In wit reeds bekende namen, geel nieuwe namen, blauw een voorschotje op wat er staat te komen en groen een bestaande naam die een beetje oostelijker op de kaart zou moeten.

Bijlage: Afgelezen (kleur) ringen

Rottumerplaat 2025

Knobbelzwaan

kleurring	aflees datum	afleesplek op eiland	ringdatum	ringplaats	opmerkingen
W-C501	020725	Westgeul	29072017	Ten Boer (Gr)	Hantumutbuorren (Fr)

Brandgans

metaalring	aflees datum	afleesplek op eiland	ringdatum	ringplaats	opmerkingen
7.188.465	20042025	Vloedmerk zuiderduintjes	08012024 Als 2ekj, dus inmiddels ruim anderhalf jaar oud.	Eemdijk	Dood en vergaan gevonden, waarschijnlijk vogelgriep van afgelopen winter

Lepelaar

kleurring	aflees-datum	afleesplek op eiland	ringdatum	ringplaats
aGP/NfPP	15042025	foeragerend	30052016	Rottumerplaat
aPY/NfNY	14052025	kolonie	16072016	Terschelling
aPN/NfNG	09042025	foeragerend	30052016	Rottumerplaat
aRR/PNfY	09042025	foeragerend	01062018	Rottumerplaat
GaG/YfLY	14052025	kolonie	07072014	Schier
GGNf/aGN	11042025	foeragerend	31052018	Schier
NfRN/aNR	18042025	foeragerend		Schier, oosterkwelder
NfYG/aPN	11042025	foeragerend	03062015	Schier, oosterkwelder
NfYN/aNY	18072025	Westgeul	2015	Ameland
W-NA3C	03052025	kolonie	07062019	Rottumerplaat
W-NA54	09062025	Westgeul	16072019	Schier
W-NCV2	07062025	Westgeul	06072021	Rottumerplaat
W-ND1U	28052025	kolonie	11062022	Rottumerplaat
W-NDB4	21072025	Westgeul	04072024	Vlieland
W-NDR2	04072025	Westgeul	01092022	Hornhuizen wad
W-NFBX	24072025	Westgeul		
W-NFSL	21062025	Westgeul	15062023	Rottumerplaat
W-NH3A	04072025	Westgeul	11062025	Rottumerplaat
W-NH7T	05072025	Westgeul	11062025	Rottumerplaat
W-NH9X	04072025	Westgeul	11062025	Rottumerplaat

W-NHA6	05072025	Westgeul	11062025	Rottumerplaat
W-NHSU	17072025	Westgeul	11062025	Rottumerplaat
W-NHT7	05072025	Westgeul	11062025	Rottumerplaat
W-NHZH	22072025	Westgeul	11062025	Rottumerplaat
BaB-@@@	03052025	Kolonie	24062011	Schiermonnikoog

Scholeksters

kleurring	1 ^e aflees datum	ringdatum	ringplaats
BLB-O3G0	06042025	25062020	Rottumerplaat
BLB-O3G6	08042025	02072020	Rottumerplaat
BLB-O3GA	08042025	27052021	Rottumerplaat
BLB-O3GC	26042025	27052021	Rottumerplaat
BLB-W1R0	15062025	14052025	Rottumerplaat
BLB-W1R1	16062025	15062025	Rottumerplaat
BLB-W1R3	02072025	28062025	Rottumerplaat
BLB-WAB2	30062025	17052022	Zwagermieden
BLB-WAB0	09072025	16052020	Lauwersmarwei
BLG-C3OT	30062025	28062025	Rottumerplaat
BLG-C3OU	30062025	28062025	Rottumerplaat
BLG-C3OX	28062025	28062025	Rottumerplaat
BLG-T788	09072025	08062020	Sandnes (N)
BLG-TL65	03062025	?	Noorwegen
BLG-WN@@	06042025	?	Rottumerplaat
BLG-WNG0	03042025	05062018	Rottumerplaat
BLG-WNG2	26042025	05062018	Rottumerplaat
BLG-WNG3	07052025	05062018	Rottumerplaat
BLG-WNG4	03042025	08062018	Rottumerplaat
BLG-WNG5	14042025	28072018	Rottumerplaat
BLG-WNG6	20042025	14082020	Rottumerplaat
BLG-WNG7	25052025	02092019	Rottumerplaat
BLG-WNG9	09042025	09062019	Rottumerplaat
BLG-WNGA	14042025	09062019	Rottumerplaat
BLG-WNGH	14042025	10062019	Rottumerplaat
BLG-WNGN	08042025	25052021	Rottumerplaat
BLG-WNGS	06042025	26052021	Rottumerplaat
BLG-WNGT	16042025	mei 2021	Rottumerplaat
BLG-WNGX	17042025	27052021	Rottumerplaat
BLG-WPB3	03042025	20052018	Rottumerplaat
BLG-WPB5	03042025	21052018	Rottumerplaat
BLG-WPB6	03042025	21052018	Rottumerplaat
BLG-WPBC	20042025	22052018	Rottumerplaat
BLG-WPBL	04042025	04062018	Rottumerplaat
BLG-WPBN	03062025	04062018	Rottumerplaat
BLG-WPBP	07042025	05062018	Rottumerplaat
BLG-WPBS	12032025	05062018	Rottumerplaat
BLG-WXBT	15042025	05062018	Rottumerplaat

BLG-WXB0	15042025	01062023	Rottumerplaat
BLG-WXB1	12042025	09062023	Rottumerplaat
BLG-WXB2	14042025	10062023	Rottumerplaat
BLG-WXB3	18042025	19062023	Rottumerplaat
BLG-WXB4	21042025	20062023	Rottumerplaat
BLG-WXB5	18042025	20062023	Rottumerplaat
BLG-WXB6	03042025	12072023	Rottumerplaat
BLG-WXBH	06042025	24052024	Rottumerplaat
BLG-WXBL	03042025	24052024	Rottumerplaat
BLG-WXBN	04042025	09062019	Rottumerplaat
BLG-WXBP	03042025	25052024	Rottumerplaat
BLG-WXBS	04042025	25052024	Rottumerplaat
BLG-WXBT	15042025	26052024	Rottumerplaat
BLG-WXBU	09042025	26052024	Rottumerplaat
BLG-WXBX	03042025	26052024	Rottumerplaat
BLP-CEWL	26052025	28062023	Groningen
BLP-CJW2	06072025	26052024	Groningen
BLP-COWL	02072025	18062023	Surhuisterveen
BLP-B4YP	03062025	07062023	Groningen
BLP-B4YY	09072025	17052025	Groningen
BLP-CEWE	19072025	18042024	Groningen
BLP-GLY0	06072025	01062021	Assen
BLR-O2RE	18072025	16052020	Harlingen
BLR-WNG4	19062025	30052023	Hoogkerk
BLR-WNG7	25052025	04062023	Hoogkerk
BLY-BYY2	09072025	25062025	Rottumerplaat
BLY-BYY3	06042025	25062021	Rottumerplaat
BLY-BYY7	22042025	27062025	Rottumerplaat
BLY-BYY8	17042025	27062021	Rottumerplaat
BLY-BYY9	03042025	27062021	Rottumerplaat
BLY-BYY0	09042025	25062021	Rottumerplaat
BLY-BYYA	03042025	27062021	Rottumerplaat
BLY-BYYC	03042025	28062021	Rottumerplaat
BLY-BYYE	03042025	20052022	Rottumerplaat
BLY-BYYH	12042025	20052022	Rottumerplaat
BLY-BYYJ	10042025	20052022	Rottumerplaat
BLY-BYYN	04042025	21052022	Rottumerplaat
BLY-BYYP	14042025	21052022	Rottumerplaat
BLY-BYYS	03042025	21052022	Rottumerplaat
BLY-BYYT	23042025	21052022	Rottumerplaat
BLY-BYYX	03042025	23052022	Rottumerplaat
BLY-R5Y8	17062025	25052025	Groningen
BLY-R5YA	09072025	25052025	Groningen
BRB-C9W2	09072025	20062018	Groningen
BRG-B8YN	03072025	19122017	Vlieland
BRG-C3O0	12042025	09062023	Rottumerplaat
BRG-C3O1	14042024	12062023	Rottumerplaat
BRG-C3O2	12042025	13062023	Rottumerplaat
BRG-C3O3	16042025	18062023	Rottumerplaat
BRG-C3O4	27042025	19062023	Rottumerplaat

BRG-C3O5	04042025	22062023	Rottumerplaat
BRG-C3O6	12042025	26052024	Rottumerplaat
BRG-C3O7	12042025	26052024	Rottumerplaat
BRG-C3O8	04062025	25062024	Rottumerplaat
BRG-C3O9	16042025	29062024	Rottumerplaat
BRG-C3OE	25062025	02072024	Rottumerplaat
BRG-C3OJ	25062025	14062025	Rottumerplaat
BRG-C3OL	22072025	14062025	Rottumerplaat
BRG-C3OP	22072025	14062025	Rottumerplaat
BRG-C3OS	02072025	14062025	Rottumerplaat
BRP-O1BP	12042025	08062023	Leek
BRP-OAGA	19072025	09062019	Groningen (Oosterbierum, Kardighen)
BRP-YCC6	070720256	02062020	Groningen
BRR-Of13	01062025	12072022	Pasternik, Polen
BRR-Y1RP	13042025	31052022	Rottumerplaat
BRR-Y2RP	13042025	12062022	Rottumerplaat
BRR-Y3RP	03042025	12062022	Rottumerplaat
BRR-RPY7	12042025	29062022	Rottumerplaat
BRR-RPY9	03062025	09072022	Rottumerplaat
BRR-RPYE	03042025	11072022	Rottumerplaat
BRR-RPYL	06042025	12072022	Rottumerplaat
BRR-RPYN	04042025	12072022	Rottumerplaat
BRR-RPYP	17042025	28072022	Rottumerplaat
BRR-RPYT	15062025	01082022	Rottumerplaat
BRR-RPYU	03042025	01062023	Rottumerplaat
BRR-RPYY	12042025	08062023	Rottumerplaat
BRY-OAGH	15072025	15062024	Haren
BRY-OAGJ	07072025	16062024	Groningen
BRY-OAGL	19072025	17062024	Groningen
BRY-OAGX	03062025	01062025	Groningen
BRY-OYBJ	06042025	25012017	Schiermonnikoog
LG-CKLJ	19072025	18052015	Assen
LY-CBLN	03062025	16072014	Rottumerplaat
MW020B2	16072025	17062020	Schiermonnikoog
?????G6	16072025	?	Schier? OB101G6?
OB022G5	13072025	02071997	Schiermonnikoog
OB022G2	16042025	20071996	Schiermonnikoog
OB102B5	15072025	2024	Schiermonnikoog
Of(13)/R	03062025	2022	Pasternik, Polen
RB-@@OA	03042025	18062016	Rottumerplaat
RB-BPOB	12042025	19052016	Rottumerplaat
RB-BPOE	04042025	19062016	Rottumerplaat
RB-BPOJ	10042025	22062016	Rottumerplaat
RB-BPOH	29042025	21062016	Rottumerplaat
RB-BPON	16042025	03062017	Rottumerplaat
RB-BPOP	06042025	04062017	Rottumerplaat
RB-BPOS	06042025	05062017	Rottumerplaat
RB-OLCJ	07072025	12062015	Kaleweg
RG-@@YZ	09072025	?	?

RG-LSRE	04042025	26062017	Rottumerplaat
RY-LCNB	07072025	09052011	Groningen
RY-LCNJ	16062025	11062011	Groningen Reitdiep
RY-LJGJ	17072025	30062003	Ameland

Bontbekplevier

kleurring	aflees datum	afleesplek op eiland	ringdatum	ringplaats
B+W(A40)	01072025	Dam2	28062025	Rottumerplaat
B+W(A41)	30062025	Overgang	28062025	Rottumerplaat
B+W(A42)	01072025	Dam2	28052025	Rottumerplaat
B+W(A43)	01072025	Dam2	28052025	Rottumerplaat
B+W(A54)	24052025	Gobi dam7	02072024	Schiermonnikoog
O/W(A59)	27072025	Dam 7		Polen
W-63	13042025	Dijkovergang	30052021	Rottumerplaat
W-74	21042025	HVP Oostgeul	18062022	Rottumerplaat
W-75	06052025	Dam2	15062022	Rottumerplaat
W-76	07042025	Dijkovergang	07062024	Rottumerplaat
W-83	24072025	Dijkovergang	24052022	Terschelling
W-8J	01062025	Gobi dam 7	01062025	Rottumerplaat

Steenloper

kleurring	1° aflees datum	ringdatum	ringplaats
L:C, R:CfA29	20072025	?	Noorwegen
Of-UUJ/R	22072025	?	Schiermonnikoog
Y/Y(48)	21072025	17112019	Bubaque Island, Bijagós archipel, Guinee-Bissau

Rosse grutto

kleurring	1° aflees datum	ringdatum	ringplaats
YW/WOf	17072025	03102016	La Rochelle (Fr)
??/NfGR	17072025	?	Castricum
M/Y+WLR	23072025	04112018	Pontevedra (Sp)
WNf/BB	18072025	?	Kingston upon Hull (GB)
W+M/Wf(C91)	21072025	?	Polen

Wulp

kleurring	1° aflees datum	ringdatum	ringplaats
R/W(AU)	22072025	?	Hiddensee (D)

Kanoet

kleurring	1 ^e aflees datum	ringdatum	ringplaats
M/OfW..	18072025	?	UK

Kokmeeuw

kleurring	1 ^e aflees datum	ringdatum	ringplaats
W-AT144	07072025	15012025	Konstanz (D)
W-EK1X	08072025	11052020	Griend
W-EMT8	17072025	26112021	Den Bosch

Stormmeeuw

kleurring	1 ^e aflees datum	ringdatum	ringplaats
rW-JU222	22052025	?	Noorwegen

Zwartkopmeeuw

kleurring	aflees datum	ringdatum	ringplaats
W-37HN	25062025	18062020	Antwerpen

Kleine mantelmeeuw

kleurring	aflees datum	ringdatum	ringplaats
R45/N	23072025	05072021	Neeltje Jans
W-LG01	23072025		België?
W-NORX	23072025		Spanje?
W-N:T4X	23072025		Spanje?
W-N:U3J	23072025		Spanje?

Zilvermeeuw

kleurring	aflees datum	ringdatum	ringplaats
B L.COP	23072025		België?

Grote Mantelmeeuw

Kleurring	1 ^e aflees datum	ringdatum	ringplaats
RAGW(CK)	30042025	?	?

Grote Stern

Kleurring	1 ^e aflees datum	ringdatum	ringplaats
B-17T	10062025	230620218	Utopia
B-19T	10062025	23062018	Texel
B-972	10062025	30052024	Norderoog
B-LN7	10062025	17062022	Krik Sandø (Dk)
B-L17	10062025	07062024	Krik Sandø (Dk)
B-NVS	24062025		Scheelhoek, Haringvliet
B-T52	10062025	23062018	Texel
O-V0U	10062025	24062020	Griend
O-VSN	10062025	110620217	Griend
R-1RS	10062025	17062022	Krik Sandø (Dk)
R-H38	10062025	17052023	Haringvliet
R-H95	10062025	27052024	Haringvliet
R-KC1	10062025		Wales
R-N3F	10062025	27072022	Zeebrugge
R-NSA	10062025	18062024	Haringvliet
R-TBX	10062025	18052025	Texel
Y-2R3	10062025	19062017	Haringvliet
Y-C80	24062025		Cumbria (UK)
Y-LRS	10062025	05082021	Agger Fægerhavn (Dk)
W-7T6	10062025	25062016	Oosterend (Texel)
W-7T8	07072025	25062016	Oosterend (Texel)
W-K7S	05062025	29062018	Sgarbheen, Lady's island lake. Ierland
W-21T	10062025	25062016	Texel

Noordse Stern

kleurring	1 ^e afleesdatum	ringdatum	ringplaats
B-JT	03052025	12062014	Griend
B-TJ	08052025	20052013	Eemshaven
R-HL	27042025	29052019	Griend
R-HK	03062025	29052019	Griend
R-HT	08052025	29052019	Griend
R-JE	06052025	02072007	Griend
W-00	11052025	16062022	Rottumerplaat
W-04	22052025	16062022	Rottumerplaat
W-1C	09052025	28052021	Rottumerplaat

W-1R	27042025	10062011	Eemshaven
W-1T	02052025	31052021	Rottumerplaat
W-2C	09052025	28052021	Rottumerplaat
W-2K	13072025	22062022	Bierum
W-2N	25052025	30052021	Rottumerplaat
W-2R	29042025	30052021	Rottumerplaat
W-3E	02072025	29052021	Rottumerplaat
W-4E	05062025	01062025	Rottumerplaat
W-4Z	21062025	01062025	Rottumerplaat
W-5C	27042025	29052021	Rottumerplaat
W-5F	20072025	01062025	Rottumerplaat
W-5N	17052025	31052021	Rottumerplaat
W-5P	05072025	01062025	Rottumerplaat
W-5T	01052025	31052021	Rottumerplaat
W-54	08052025	19052012	Eemshaven
W-64	02052025	16062022	Rottumerplaat
W-69	09052025	16062022	Rottumerplaat
W-6E	17052025	30052021	Rottumerplaat
W-6T	18072025	31052021	Rottumerplaat
W-6V	08052025	20052008	Griend
W-6Z	07072025	01062025	Rottumerplaat
W-7A	10052025	28052021	Rottumerplaat
W-7K	03052025	18062022	Rottumerplaat
W-7R	04062025	30052021	Rottumerplaat
W-7X	25052025	18062022	Rottumerplaat
W-8J	14062025	01062025	Rottumerplaat
W-8L	06072025	06042011	Eemshaven
W-8Z	13062025	01062025	Rottumerplaat
W-9J	03062025	01062025	Rottumerplaat
W-9K	19072025	01062025	Rottumerplaat
W-9Z	02072025	01062025	Rottumerplaat
W-CP	23072025	00072024	Rottumerplaat
W-EF	26042025	07062024	Rottumerplaat
W-EK	17072025	07062024	Rottumerplaat
W-EP	27042025	07062024	Rottumerplaat
W-ER	08052025	07062024	Rottumerplaat
W-EV	15052025	07062024	Rottumerplaat
W-FF	15052025	06062024	Rottumerplaat
W-J.4	20052025	18062022	Rottumerplaat
W-J7	25052025	18062022	Rottumerplaat
W-J8	27052025	01062025	Rottumerplaat
W-JC	15052025	06062024	Rottumerplaat
W-JE	18052025	300620129	Bierum
W-JF	14052025	19062019	Bierum
W-JT	15052025	19062013	Griend
W-K1	15062025	01062025	Rottumerplaat
W-K3	19072025	01062025	Rottumerplaat
W-K4	06072025	01062025	Rottumerplaat
W-K9	13072025	01062025	Rottumerplaat
W-OC	27042025	28052021	Rottumerplaat

W-P1	25062025	01062025	Rottumerplaat
W-P5	02072025	01062025	Rottumerplaat
W-P7	03072025	01062025	Rottumerplaat
W-R8	01072025	11052022	Broedeiland Stern
W-S2	03072025	31052025	Rottumerplaat
W-TA	09052025	07072020	Bierum
W-Z6	18072025	18062022	Rottumerplaat
W-Z8	18072025	18062022	Rottumerplaat (Ameland)

Visdief

Kleurring	1 ^e aflees datum	ringdatum	ringplaats
N-NUF	21062025	02072021	Ouddorp (Markenje)
Y-LJK	23052025	22062022	Gassel
W-AK3	03052025	16062022	Rottumerplaat
W-AK5	05072025	16062022	Rottumerplaat
W-AP5	03052025	17062022	Rottumerplaat
W-AR0	25042025	31052021	Rottumerplaat
W-AR7	29052025	29052021	Rottumerplaat
W-AZV	21052025	08072019	Westereen (Zwagerwieden)
W-C00	04062025	01062025	Rottumerplaat
W-C01	02062025	01062025	Rottumerplaat
W-C02	25062025	01062025	Rottumerplaat
W-C03	05062025	01062025	Rottumerplaat
W-C04	25062025	01062025	Rottumerplaat
W-C05	25062025	01062025	Rottumerplaat
W-C06	07062025	01062025	Rottumerplaat
W-C07	11062025	01062025	Rottumerplaat
W-E36	27042025	06072019	Bierum
W-EC5	27042025	10072016	Eemshaven
W-ET8	27042025	13082018	Bierum
Wf-AKC	18072025		Polen
Wf-AKL	27042025	20062020	Gdansk (P)
Wf-PAJ	27042025	06062023	Terschelling
Wf-PJT	10052025	08062023	Hollum, Ameland
Wf-PFP	08052025	01062022	Balgzandpolder(?)
Wf-PNA	10052025	27052024	Langesloot, Ameland
Wf-PPC	08052025	15062023	Rottumerplaat
Wf-PSA	09072025	18062022	Rottumerplaat

Bijlage: Nieuw geringd

Rottumerplaat 2025

Visdief

W-C00
W-C01
W-C02
W-C03
W-C04
W-C05
W-C06
W-C07

Noordse Stern

W-2C
W-6E
W-8Z
W-R8
W-J4
W-J7
W-K1
W-K3
W-K5
W-K9
W-L7
W-S2
W-S4
W-S5
W-S6

Bontbekplevier

W-8J
B+W(A40) (juv)
B+W(A41) (juv)
B+W(A42) (juv)
B+W(A43)

Scholekster


BLB-W1R0
BLB-W1R1
BLB-W1R2 (juv)
BLB-W1R3 (juv)
BLG-C3OT (juv)
BLG-C3OU (juv)
BLG-C3OX
BRG C3OJ
BRG-C3OL
BRG-C3ON
BRG-C3OP

Lepelaar

R-NH6T zender 'Lauwers'
R-NHDA zender 'Borkum'
NH6V
NHHS
NH3A
NH9T
NHA6
R-NHJ2 zender 'Kria'
NHZH
R-NHXR zender 'Rebel'
NHSU
NH9X
NHT7
NHUJ
NHJP
NH1J
NHVP
NH7Z

Bijlage : Ontwikkeling voormalig broedvogels (5 jaar geen broedpaar)


Van een aantal broedvogels die in het verleden op Rottumerplaat een territorium hebben gehad, of zelfs succesvol hebben gebroed zijn de nieuw hervonden historische gegevens verwerkt in soortgelijke grafieken als in het hele verslag zijn opgenomen. Wanneer de soort de laatste 5 jaar niet meer tot broeden is gekomen zijn ze in deze bijlage terecht gekomen.




Krakeend, zowel in 2014 als 2019 meerdere waarnemingen van paartjes binnen de datumgrenzen



Smient, alleen in 2019 gaf een waaks mannetje de aanleiding een broedgeval te noteren.




Zomertaling. In 1996 zelfs twee paartjes




Blauwe kiekendief, alleen in 1994 en 1995 is sprake van een broedpaar.




Fazant, in het vogelwachtersverslag van 1978 wordt gesproken over een geslaagd broedgeval. In latere overzichten lijkt deze waarneming verdwenen




Kievit, vanaf 1995 net iets meer dan 20 jaar een trouwe broeder van het eiland. Dit jaar heeft ie zich zelfs helemaal niet laten zien.




Zwartkopmeeuw, slechts een aantal jaar een enkel broedgeval




Turkse tortel, even leek de Turkse tortel voet aan de grond te hebben gekregen. Deze eeuw bleek daar de klad in gekomen.




Zomertortel, slechts een aantal jaar een enkel broedgeval



Velduil, heeft in 2012 voor het laatst gebroed op Rottumerplaat. Zijn favoriete voedsel: muizen ontbreken op dit eiland



Roodborsttapuit. Alleen in 2017 een broedgeval. In 2021 wel in de autoclustering van de BMP maar door de vogelwachters beoordeeld als onwaarschijnlijke broeder dat jaar.



Roodmus. Het genoemde broedgeval van 1992 wordt in het jaarverslag van het jaar daarna gerectificeerd, In 1988 en 1989 wel twee maal een broedgeval op het eiland.

Bijlage: Broedvogels, historisch overzicht broedparen

	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
bergeend	11		11	9	14	4	47	5 3-14		10	27	24	28	17
blauwborst														
blauwe kiekendief														
boerenwaluw			1			2	1	0	0	1	1	1	0	0
bontbekplevier	1		1	2	1	2	2	2 4-5		4	3	5	2	6
bonte vliegenvanger														
bosrietzanger														
brandgans														
braamsluiper														
bruine kiekendief														
buizerd														
dwergstern						1	1	5	1	8	8	0	0	25
eider	4		5	5	11	2	40	7	20	110	86	134	114	140
ekster								0	0	0	0	0	0	1
fazant								0-1						
fitis														
gele kwikstaart														
grasmus								0	0	0	0	0	0	0
graspieper	3		5	4	20	3	9 11	12-25		12	68	39	49	55
grauwe gans														
grauwe klauwier														
grauwe vliegenvanger														
grote canadeese gans														
grote mantelmeeuw														
grote stern						2	84	3	238	10	0	0	183	5
heggemus														
holenduif								0	1	3	4	6	6	7
houtduif								0	0	0	0	0	0	0
kauw														
kievit														
kleine karekiet														
kleine mantelmeeuw	2		3	3	5	4	15 6-7	10-20		12	16	25	30	28
kluut														
kneu				1	2	5	3 2-3		3	3	2	2	5	2
koekoek														
kokmeeuw				18	2	2		6	2	10	90	82	32	73
krakeend														
lepelaar														
merel														
nachtegaal														
nijlgans														
noordse dief *	300		180	300	425	350	375- 431	650- 380	1000	586	398			961
noordse stern														
oeverwaluw														
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984

* In het verleden werden noordse stern en visdief
niet altijd op soort gebracht maar samen geteld

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	
27	6	6	6	3	10	11	12	6	11	8	11	11	bergeend
													blauwborst
								1	1				blauwe kiekendief
1	2	1	0	0	1		2						boerenwaluw
5	2	3	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	bontbekplevier
													bonte vliegenvanger
				0-1									bosrietzanger
													brandgans
													braamsluiper
										1	0	1	bruine kiekendief
													buizerd
7	26	30	23	16	0	4	14	5	41	22	32	85	dwergstern
258	222	250	281	624	516	644	796	1245	744	767	932	1212	eider
2	1	2	2	2	3	3	4	8	8	5	7	6	ekster
													fazant
				0-1	0-1	0-1		1	1			1	fitis
													gele kwikstaart
0	0	1	0	0 0-1			0-1				1		grasmus
53	75	75	90	92	40	16	9	9	8	6	6	6	graspieper
													grauwe gans
													grauwe klauwier
													grauwe vliegenvanger
													grote canadeese gans
													grote mantelmeeuw
1	0	0	1	0						0	226	805	grote stern
													heggemus
10	10	20	5	4	7	9	9	12	12	10	11	7	holenduif
0	0	1	1	5	4	5	4	7	6	4	5	8	houtduif
					2	3	3	10	7	9	12	12	kauw
										1	3	2	kievit
				0-1		0-1		1	1				kleine karekiet
24	55	45	75	68	71	90	106	115	163	232	264	435	kleine mantelmeeuw
									1	6	12	14	kluut
3	0	2	0	0	1	2	2			1	2		kneu
											1		koekoek
92	26	54	55	30	0	9	5	8	36	48	71	72	kokmeeuw
													krakeend
									0	1	0	0	lepelaar
													merel
													nachtegaal
													nijlgans
897	512	566	161	26									noordse dief
													noordse stern
													oeverwaluw

samenstelling overzicht 21e eeuw: 2021,
toevoeging cijfers 20e eeuw: 2025

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
bergeend	7	10	10	7	19	22	17	13	13	14	18	17	17	50
blauwborst			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
blauwe kiekendief			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
boerenwaluw	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0-1	0	0	0	0
bontbekplevier	2	5	3	3	4	2	4	7	7	8	5	7	7	7
bonte vliegenvanger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bosrietzanger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brandgans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
braamsluiper			1	0	0	0	0	0	0-1	0	0	1	2	1
bruine kiekendief	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	6	5	4	4
buizerd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
dwergstern	32	21	25	17	34	62	19	18	13	10	9	5	4	6
eider	1061	959	589	636	793	1033	1063	705	353	433	807	484	822	414
ekster	5	5	4	5	4	5	5	4	0-4	0-4	5	3	4	5
fazant			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fitis	1	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
gele kwikstaart	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
grasmus	1		1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	1	3
graspieper	10	8	12	11	18	14	21	38	46	40	41	45	41	41
grouwe gans			0	0	0	0	0	1	1	3	9	17	24	27
grouwe klauwier			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
grouwe vliegenvanger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
grote canadeese gans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
grote mantelmeeuw			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
grote stern	2335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
heggemus			0	0	0	1	1	1	0-1	0	1	0	0	1
holenduif	6	5	4	6	4	3	2	1	0	0	0	0	2	2
houtduif	8	4	3	4	5	6	5	0	0	0	0	0	0	0
kauw	14	16	26	22	36	24	15	21	23	0-8	12	8	9	12
kievit	5	5	4	3	4	6	4	3	4-7	3	3	3	3	2
kleine karekiet			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kleine mantelmeeuw	490	392	554	715	227	1014	1156	1484	1150	1535	1409	1117	1106	1531
kluut	18	15	7	17	7	7	0	7	2	3	0	3	2	1
kneu		1	0	1	0	0	0	1	0-1	0-1	0	0	1	1
koekoek		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kokmeeuw	73	123	56	47	136	199	1	33	220	137	92	6	20	28
krakeend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lepelaar	4	3	5	10	19	16	26	24	23	30-39	32	31	33	35
merel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachtegaal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nijlgans			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
noordse dief														
noordse stern			82	17	87	139	32	74	210	20	27	30	40	33
oeverwaluw			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
174	135- 180	66	100- 200	100- 200	150	?	58	33+	47-73	25-35	9	21+	55-68	bergeend
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	blauwborst
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	blauwe kiekendief
1	2	3	6	12	7	5	6	1	0	2	6	4	4	boerenzwaluw
7	7	5	3	3	7	5	5	6	5	7	4	3	7	bontbekplevier
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	bonte vliegenvanger
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	bosrietzanger
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2-4	brandgans
1	2	0	0	1	0-1	1	2	0	4	5	1	5	4	braamsluiper
3	4-5	4	4	4	5-6	5	3	6	7	4	3	5	8	bruine kiekendief
1	1	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	1	2	buizerd
4	2-1	0	11	22	9-19	1	8	32	8	0	10	0	18	dwergstern
582	800 - 1000	400	950	730	650- 800	?	775	133+	245- 383	136- 802	139- 511	111- 697	133- 563	eider
3	0	3	2	3	1	1	2	2	2	0	0	0	0	ekster
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	fazant
1	1	1	1	1	0	7	4	0	5	0-2	4	0-2	2	fitis
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2		0	gele kwikstaart
6	5	6	8	3	0	4	3	6	2	1	7	7	9	grasmus
57	50	31	50	42+	40	?	83	42	80	66	52	65	62	graspieper
29	20-35	8+	30-40	40	122	41	133	100- 200	176	233	138	252	227	grauwe gans
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	grauwe klauwier
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	grauwe vliegenvanger
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	grote canadeese gans
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	grote mantelmeeuw
0	0	0	0	0	0		1	2	0	0	0	0	0	grote stern
1	3	3	3	3	3	4	8	5	3	9	19	12	14	heggemus
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	2	holenduif
1	4	1	1	0	1	4	1	0	3	0	2	1	3	houtduif
5	7	3	6	3	8	6	7	2+	2	7	4	17	7	kauw
2	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kievit
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-1	0-1	0-1	0	kleine karekiet
1504	2600- 3400	1610	3050	3600	2900	2184	2447	1995	3098	3515	2996	3387	2649	kleine mantelmeeuw
2	0	3	0	2	0	3	1	0	0	0	1	0	0	kluut
1	0	2	11	2	4	6	5	8	4	9	12	12	14	kneu
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	koekoek
20	0	40	10	33	60-65	120	63	127	103	100- 107	29	6	2	kokmeeuw
0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	krakeend
35	41-44	48	59	69	84	51	53	76	70	68-68	62	40	70	lepelaar
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0-2	0	0	2	merel
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	nachtegaal
0	0	1	2	3	2	6	4	3	2-5	6	1	3	5	nijlgans
														noordse dief
6	8	3	6	17-20	23-27	51	97	95	156	93- 128	266	245	179	noordse stern
0	0	0	0	0	14-18	35	16	16	20	40	72	104	79	oeverzwaluw
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
pijlstaart														
rietgors														
rietzanger														
roodborst														
roodborsttapuit														
roodmus														
scholekster	70		55	80	45	31	163	85-300	153	324	237	307	303	298
slechtvalk														
slobeend														
smient														
spotvogel														
spreeuw														
sprinkhaanzanger														
stormmeeuw	9		4	7	3	5	21	14	20	12	35	14	42	39
strandplevier	9		4	11	7	7	2	5	10-20	10	6	6	5	12
tapuit														
tjiftjaf								0	0	0	0	1	0	0
tortelduif/zomertortel														
tuinfluiter														
tureluur								7	12	8	6	6	7	3
turkse tortel														
veldleeuwerik	15		10	10	20	10	12	15	10-25	20	31	22	24	25
velduil														
vink														
visdief								360	500		300	526	637	600
waterral														
wielewaal														
wilde eend				1		3	3	2	3	1	1	3	5	5
winterkoning								0	1	0	0	0	0	0
wintertaling														
witte kwikstaart	3		5	4	5	2	2	2-4	2-6	1	4	5	7	9
wulp														
zilvermeeuw	500		750	600	600	1000	1000	1000-1950	1155	1650	2591	2522	2120	2072
zomertaling														
zwarte kraai														
zwarte roodstaaat														
zwartkop														
zwartkopmeeuw														
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	
													pijlstaart
													rietgors
													rietzanger
													roodborst
													roodborsttapuit
													roodmus
257	240	220	218	249	238	137	172	160	137	221	163	156	scholekster
													slechtvalk
													slobeend
													smient
					0-1		0-1						spotvogel
													spreeuw
					1								sprinkhaanzanger
26	27	10	17	23	18	21	34	39	46	51	40	57	stormmeeuw
6	10	9	11	10 5-6		5	6	3	5	2	5	4	strandplevier
													tapuit
0	1	0	1	1	1	1 0-1		1	2	1	1	1	tjiftjaf
							0-1						tortelduif/zomertortel
					0-1	0-1						1	tuinfluiter
2	7	5	7	4	5	4	5	3	4	2	2	3	tureluur
									1	1	1	1	turkse tortel
19	27	27	16	7	16	10	9	6	6	5	5	5	veldleeuwerik
													velduil
					1								vink
			147	99	6	132	175	176	357	242	305	344	visdief
													waterral
3 1-3	3-4		2	1	5	3	5	8	9	8	13	17	wielewaal
0	0	0	0	0	1								wilde eend
													winterkoning
6	14	15	11	9	5	3	4	4	1	2	2	3	wintertaling
													witte kwikstaart
													wulp
2782	2577	2500	2601	2512	2582	2993	2950	2525	2721	2060	1816	2118	zilvermeeuw
													zomertaling
							1	1			1	1	zwarte kraai
													zwarte roodstaart
													zwartkop
													zwartkopmeeuw
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
pijlstaart		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rietgors			0	0	0	0	2	3	0-3	0-2	1	1	2	3
rietzanger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
roodborst			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
roodborsttapuit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
roodmus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
scholekster	172	171	162	149	137	131	212	207	192	221	234	219	206	232
slechtvalk			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
slobeend			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
smient			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spotvogel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spreeuw			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sprinkhaanzanger			0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1
stormmeeuw	62	52	63	68	101	82	86	87	113	128	113	47	52	77
strandplevier	3	1	0	1	1	0	0	1	2	1	3	3	1	0
tapuit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tijftjaf	1	2	1	1	0	0	2	3	0-2	0-1	1	1	0	0
tortelduif/zomertortel		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tuinfluiter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tureluur	2	2	3	2	6	4	6	4	4	4	5	5	7	7
turkse tortel	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
veldleeuwerik	10	10	10	11	12	9	11	11	12	18	33	36	42	50
velduil	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
vink	1		0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
visdief	335	291	43	14	113	69	2	217	602	716	244	653	336	71
waterral					0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
wielewaal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wilde eend	15	19	36	40	27	35	18	20	28	28	20	16	14	13
winterkoning			1	1	1	1	1	2	0-3	0-3	1	1	0	0
wintertaling			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
witte kwikstaart	3	4	3	4	3	3	5	5	0-4	0-5	7	9	9	9
wulp	1		0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	4
zilvermeeuw	1521	1488	1675	1686	2245	1434	1742	1276	1734	1525	1647	1162	1299	1155
zomertaling														
zwarte kraai	1	1	1	1	1	3	0	0	0-4	0-4	5	6	6	5
zwarte roodstaaat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwartkop			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwartkopmeeuw							1	1	1	0	0	1	1	0
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011

Nota bene:

Over 2018 en 2023 is geen verslag verschenen

Cijfers uit de BMP, kolonietellingen en naar horen zeggen

Zonder interpretatie of duiding van debetreffende vogelwachters.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	pijlstaart
2	0	1	0	1	2	4	13	8	5	1	7	1	0	rietgors
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-1	0	0	1	rietzanger
0	0	0	0	0	0	0	0-1	0	0	0	0	0	1	roodborst
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	roodborsttapuit
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	roodmus
220-					150-									
233	270	150	136	195	200	79	119	55	144	173	69	110	211	scholekster
0	0	0	1	1	1	1	2	0	0-1	1	1	1	0-2	slechtvalk
0	0	0-1	7	3	0	2		0	3	0	0	0	1	slobeend
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	smient
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-4	2	spotvogel
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	spreeuw
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	sprinkhaanzanger
45	20	31	14	4	6-8	18	30	28	36	19	18	19	28	stormmeeuw
1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	strandplevier
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	2-3	tapuit
1	1	3	4	2	5	6	4	1	6	4	11	7	6	tijftjaf
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	tortelduif/zomertortel
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0-1	0	0-2	0	tuinfluiter
7-10	30-50	11	23	22	30-40	12	32	14+	37	31	15	15	53	tureluur
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-1	0	0	0	turkse tortel
47	56	42	32	66	40	?	64	46	73	179	139	71	76	veldleeuwerik
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	velduil
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0-2	1	1	0	vink
250	2	1	8-20	20	34-40	90	65	105	65	94	53	39	105	visdief
0	0-1	1	1	1	1	5	0	1	0	0-2	4	3	1-2	waterral
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	wielewaal
6	2-3	4	3	14	6-10	1	9	?	6	3	4	3	12	wilde eend
1	0	0	0	0-1	0	1	6	1	1	0-1	5	0	2	winterkoning
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	wintertaling
11	7	9	14	10	7-10	5	5	4	7	9	10	3	8	witte kwikstaart
7	9-12	7	7	4	5-6	6	7	3+	7	3	5	10	11	wulp
700-														
1797	1000	1016	1200	1500	1100	1546	651	779	948	1017	879	757	956	zilvermeeuw
														zomertaling
5	8	6	10	6	8	4	5	5	7-8	2	8	4	7	zwarte kraai
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0-1	0	0	1	zwarte roodstaart
0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0-1	2	2	2-4	zwartkop
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	zwartkopmeeuw

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Geraadpleegde bronnen:

Fauna van Rottum, Zekhuis & de Vries, 2012

Broedvogelmonitoring op de Rottums in 2007-2016, Sovon-rapport 2019/28

Vogelwachtrapporten van de afgelopen jaren voor zover aanwezig op Rottumerplaat.

(Hierin worden veelal niet alleen de cijfers van dat jaar, maar vaak ook historische cijfers benoemd.)

Bijlage : Overige waarnemingen

Nachtvlinders

Soort	Latijnse naam	Vangsten	Aantal	Schaars op R'plaat
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	5	5	
Sint Jansvlinder	Zygaena filipendule	5	5	
Hoornaarvlinder	Sesia apiformis	1	1	2e waarneming
Rietvink	Euthrix potatoria	2	2	
Kleine hageheld	Lasiocampa trifolii	1	1	
Heideringelrups	Malacosoma castrensis	3	5	
Ringelrups	Malacosoma neustria	11	46	
Witroze stipspanner	Scopula emutaria	9	12	
Grijze stipspanner	Idaea aversata	4	4	
Vlekstipspanner	Idaea dimidiata	4	4	
Dwergstipspanner	Idaeafuscovenosa	10	14	
Zwartbandspanner	Xanthorhoe fluctuata	1	1	
Gestreepte goudspanner	Camptogramma bilineata	30+	100+	
Voorjaarsdwergspanner	Eupithecia abbreviata	1	1	1e waarneming
Zwartvlekdwergspanner	Eupithecia centraureata	7	10	
Bijvoetdwergspanner	Eupithecia innotata	3	4	
Vlasbekdwergspanner	Eupithecia linariata	2	2	
Guldenroededwergspanner	Eupithecia virgaureata	1	1	
Gewone dwergspanner	Eupithecia vulgata	1	1	
V-dwergspanner	Chloroclystis v-ata	1	1	
Groene dwergspanner	Pasiphila rectangulata	1	1	
Zwartkamdwergspanner	Gymnoscelis rufifasciata	2	3	
Donker klaverblaadje	Macaria alternata	6	9	
Puntige zoomspanner	Epione repandaria	4	4	
Kortzuiger	Crocallis elinguaris	3	5	
Vliervlinder	Ourapteryx sambucaria	1	1	
Taxusspikkelspanner	Peribatodes rhomboidaria	4	5	
Bruine grijsbandspanner	Babera exanthemata	1	1	
Groot avondrood	Deilphaila elpenor	1	1	
Populierenpijlstaart	Laothoe populi	26	43	
Kolibrivlinder	Macroglossum stellatarum	1	1	
Hermelijnlinder	Cerura vinula	5	14	
Bruine wapendrager	Clostrera curtula	4	4	
Bastaardsatijnvlinder	Euproctis chrysorrhoea	21	267	
Satijnvlinder	Leucoma salicis	9	16	
Klein kokerbeertje	Eilema pygmaeola	9	25	
Geel beertje	Eilaema soroecula	1	1	
Grasbeertje	Coscinia cribraria	10	19	
Witte tijger	Spilosoma lubricipeda1	1	1	
Kleine beer	Phragmatobia fuliginosa	15	89	

Sint Jacobsvlinder	Tyria jacobaeae	30+	100+	
Mi-vlinder	Euclidia mi	2	2	
Roesje	Scoliopteryx libatrix	3	3	
Hopsnuituil	Hypena rostralis	1	1	1e waarneming
Kleine groenuil	Earias clorana	7	9	
Populierengroenuil	Earias vernana	2	2	2e jaar op R'plaat
Variabele worteluil	Euxoa cursoria	4	6	
Graanworteluil	Euxoa tritici	12	23	
Gewone worteluil	Agrotis exclamationis	6	6	
Grote worteluil	Agrotis ipsilon	8	10	
Putta-uil	Agrotis puta	1	1	
Duinworteluil	Agrotis rioae	1	2	
Gewone velduil	Agrotis segetum	2	3	
Bonte worteluil	Agrotis vestigialis	3	3	
Haarbos	Ochropleura plecta	1	1	
Volgeling	Noctua comes	1	1	
Breedband huismoeder	Noctua fimbriata	2	3	
Huismoeder	Noctua pronuba	16	18	
Gewone breedvleugeluil	Diarsia rubi	9	10	
Sputtie-uil	Anarta trifolii	3	3	
Tandjesuil	Sideridis turbida	7	8	
Groente-uil	Lacanobia loeracea	9	11	
Variabele w-uil	Lacanobia suasa	13	18	
Brede w-uil	Lacabobia cerasi	1	1	1e waarneming
Tweestreepvoorjaarsuil	Orthosia cerasi	4	4	
Kleine voorjaarsuil	Orthosia cruda	1	1	1e waarneming
Variabele voorjaarsuil	Orthosia incerta	1	1	
Bandvoorjaarsuil	Orthosia opima	1	1	
Witstipgrasuil	Mythimna albipuncta	1	2	
Stompvleugelgrasuil	Mythimna impura	1	1	
Bleke grasuil	Mythimna pallens	14	22	
Zuidelijke grasuil	Mythimna vitellina	3	3	
Komma-uil	Leucania comma	1	1	
Schilddrager	Subacronicta megacephala	1	1	
Bont schaapje	Acronicta aceris	2	2	1e waarneming
Zuringuil	Acronicta rumicis	2	2	
Schedeldrager	Craniophora ligustri	2	2	
Donkergroene korstmosuil	Cryphia algae	2	2	2e waarneming
Zwart weeskind	Mormo maura	1	1	2e waarneming
Vogelwiekje	Dypterygia scabriuscula	2	2	2e waarneming
Meldevlinder	Trachea atriplicis	1	1	3e waarneming
Agaatvlinder	Phlogophora meticulosa	1	1	
Veldgrasuil	Apamea anceps	11	11	
Graswortelvlinder	Apamea monoglypha	2	2	
Zeeuwse grasworteluil	Apamea oblonga	1	1	
Grauwe grasuil	Apamea remissa	4	9	

Zandhalmuiltje	Mesoligia furuncula	1	1	
Zandhaverboorder	Longalatedes elymi	2	2	
Gewone grasuil	Luperina testacea	2	2	
Geelbruine vlekuil	Amphipoea fucosa	2	2	
Zuidelijke stofuil	Hoplodrina ambigua	5	10	
Gewone stofuil	Hoplodrina octogenaria	3	4	
Morpheus stofuil	Caradrina morpheus	12	22	
Zilverstreep	Deltote bankiana	2	2	
Donkere marmeruil	Deltote pygaraga	1	1	
Gamma-uil	Autographa gamma	10	35	
Kijkgaatje	Monopis laevigella	1	1	
Zustermot	Monopis monachella	2	2	
Elfenbankjesmot	Morophaga choragella	1	1	
Zeeasterooglapmot	Bucculatrix maritima	1	1	
Margrietooglapmot	Bucculatrix nigricomella	1	1	1e waarneming
Seringensteltmot	Gracillaria syringella	3	4	
Vogelkersstippelmot	Yponomeuta evonymella	6	6	
Wilgenstippelmot	Yponomeuta rorrella	1	1	
Koolmotje	Plutella xylostella	6	12	
Kleine mosboorder	Batia lunaris	2	3	
Witkopmot	Endrosis sarcitrella	4	6	
Bruine huismot	Hofmannophila pseudospretella	6	10	
Waddenkaartmot	Agonopteris curvipunctosa	1	2	4e waarneming
Witte grasmineermot	Elachista argentella	1	1	1e waarneming
Duinzeggemineermot	Elachista biatomella	1	1	
Keizersgalmot	Goniodoma limoniella	1	1	2e jaar op R'plaat
Gewone wilgenroosjesmot	Mompha epilobiella	2	2	
Witte dominomot	Oegoconia dearatella	8	12	
Grauwe spaandermot	Blastobasis phycidella	1	1	1e waarneming
Platte spaandermot	Hypatopa inuctella	1	1	2e jaar op R'plaat
Puntvleugelpalpmot	Brachmia blandella	2	2	
Geelwitte mospalpmot	Bryotropha affinis	1	1	
Oranje mospalpmot	Bryotropha terella	2	2	
Lichte kustmot	Caryocolum blandulella	1	1	
Zilverbandpalpmot	Oxypteryx wilkella	4	5	
Vlekzandvleugeltje	Scobipalpa costella	1	1	2e jaar op R'plaat
Bietzandvleugeltje	Scrobipalpa ocellatella	4	4	
Zeekraalzandvleugeltje	Scrobipalpa salinella	2	3	
Kameleonbladroller	Acleris hastiana	1	1	2e jaar op R'plaat
Zilvervlekbladroller	Pseudargyrotoza conwagana	10	100+	
Zomerbladroller	Ditula angustiorana	1	1	2e jaar op R'plaat
Grote appelbladroller	Archips podana	1	1	
Leverkleurige bladroller	Pandemis heparana	1	1	
Tuinbladroller	Clepsis sonsimilana	2	2	
Koolbladroller	Clepsis spectrana	10	11	

Kombladroller	Aethes sneathmanniana	1	1	
Distelbladroller	Agapeta hamana	2	3	
Getekende biesbladroller	Bactra furfurana	1	1	1e waarneming
Brandnetelbladroller	Celypha lacunana	5	5	
Smallijnbladroller	Celypha rufana	2	3	
Paardenbloembladroller	Celypha striana	3	3	
Kamillebladroller	Cochylidia implicitana	4	6	
Sint Jacobsbladroller	Cochylis atricapitana	30	143	
Fraaie oogbladroller	Epinotia cruciana	1	1	
Zwartwit knoopvlekje	Eicosma campoliliana	1	1	
Distelknoopvlekje	Eucosma cana	3	4	
Tweekleurig knoopvlekje	Eucosma obumbratana	1	1	
Blauw smalsnuitje	Eupoecilia ambiguella	9	20	
Zwartstipbladroller	Gynnidomorpha vestisana	1	1	1e waarneming
Populierenbladroller	Gysonoma aceriana	9	17	
Witsnuitpopulierenbladroller	Gysonoma ambiguella	1	1	
Grote witvlakbladroller	Hedya ochroleucana	3	3	
Hertshooibladroller	Lathronympha stigana	1	1	
Rozenhermelijnbladroller	Notocelia rosaecolana	4	5	
Bramenbladroller	Notocelia uddmaniana	2	2	
Woudbladroller	Orthotaenia undulana	10	12	
Scherpbandbladroller	Paramesia gnomana	1	1	
Rode knopbladroller	Spilnota ocellana	3	3	
Brandnetelmot	Anthophila fabriciana	1	1	2e waarneming
Lamsoorvedermot	Agdistis bennetii	1	1	5e waarneming
Levervlekmot	Ancylosis oblitella	1	1	2e jaar op R'plaat
Helmgrasmot	Aneastia lotella	3	3	
Sparappelboorder	Dioryctria abietella	1	1	
Strooiselmot	Endotricha flammealis	4	5	
Loogkruidlichtmot	Gymnancyla canella	5	10	
Traingelmot	Hypsopygia costalis	1	1	
Duinmosmot	Lamoria zelleri	1	2	
Distelhermelijntje	Myelois circumvoluta	1	1	
Zomerduinmot	Nyctegretis lineana	2	3	
Prachtmot	Oncocera semirubella	2	2	
Weidemot	Phycitodes binaevella	1	1	
Kustweidemot	Phycitodes saxicola	1	1	2e jaar op R'plaat
Kraslijnmot	Pima boisduvaliella	4	4	2e jaar op R'plaat
Pinokkiomot	Synaphe punctalis	10	30	
Vroege granietmot	Scoparia ambigualis	2	2	
Oranje granietmot	Scoparia lacustrata	2	5	2e jaar op R'plaat
Lichte granietmot	Eudonia lacustrata	5	5	
Variabele granietmot	Eudonia mercurella	4	7	
Rietmot	Chilo phragmitella	1	1	
Lisdoddesnuitmot	Calamothropa paludella	1	1	
Gewone grasmot	Chrysoteuchia culmella	5	37	

Vroege grasmot	Crambus lathoniellus	4	19	
Bleke grasmot	Crambus perlella	7	13	
Moerasgrasmot	Agriphila inquinatella	3	8	
Blauwooggrasmot	Agriphila straminella	5	7	
Variabele grasmot	Agriphila tristella	2	2	
Geaderde grasmot	Pediasia aridella	1	1	
V-baardsnuitmot	Platytes cerussella	10	22	
Duikermot	Acentria ephemerella	1	1	2e jaar op R'plaat
Gewone coronamot	Anania coronata	1	1	
Salielichtmot	Anania verbascalis	1	1	1e waarneming
Oranje kruidmot	Udea ferrugalis	1	1	
Satijnlichtmot	Palpita vitrealis	1	1	
Luipaardlichtmot	Nomophila noctuella	2	2	

Dagvlinders

Zwarsprietdikkopje
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
Kleine vuurvinder
Icarusblauwtje
Atalanta
Distelvlinder
Dagpauwoog
Kleine vos
Bruin zandoogje
Heivlinder
Hooibeestje
Citraenvlinder
Landkaartje

Libellen

Variabele waterjuffer
Lantaarntje
Blauwe glazenmaker
Vroege glazenmaker
Paardenbijter
Grote keizerlibel
Glassnijder
Viervlek
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel

Sprinkhanen en krekels

Kustsprinkhaan
Bruine sprinkhaan
Grote groene sabelsprinkhaan

Bijen en wespen

Honingbij
Boomhommel

Veenhommel
Moshommel
Akkerhommel
Aardhommel
Grote koekoekshommel
Diplazon laetarius
Itopectis maculator
Ophion minutus
Pimpla rufipes
Gewone steekmier
Koolzwarte metselspinnendoder
Grote rupsdoder
Europese hoornaar
Knollenbladwesp

Vliegen en muggen

Brandnetelgalmug
Tuindriestrep
Bochsteltje
Tweevlekklangpoot

Hoefijzertijger
 Spoilertijger
 Zandtijger
 Grijze beeklangpoot
 Oranje maanmug
 Kool-langpootmug
 Gazonlangpootmug
 Zandroofvlieg
 Roodwangbromvlieg
 Sprinkhaanvlieg
Hercostomus nigriplantis
Poecilobothrus nobilitatus
Meiosimyza decempunctata
Minettia longipennis
Graphomaya maculata
 Kleine snipvlieg
 Strontvlieg
 Rouwslakkendoder
 Kweldersnuitwapenvlieg
 Zwart-witte-snuitwapenvlieg
 Snor zweefvlieg
 Kustvlekoog
 Onvoorspelbare bijvlieg
 Blinde bij
 Terrasjeskommazweefvlieg
 Gewone pendelvlieg
 Gewone driehoekzweefvlieg
 Variabel elfje
 Doorkopszweefvlieg
 Witte halvemaan zweefvlieg
 Gele halvemaan zweefvlieg
 Grote langlijf
 Bessenband zweefvlieg
 Bosband zweefvlieg
 Platte zweefvlieg
Gastrolepta anthracina
Thelaira nigripes
 Akkerdistelboorvlieg
 Gewone viltvlieg
Tetanops myopina

Kevers

Strandzandloopkever
 Roodpoothalmkruiper
 Tweekleurige glansloper
 Roodpootwatertor
 Zomersmaragd

Rozenkever
 Muisgrijze kniptor
 Koperkleurige kniptor
Cantharis nigra
 Kleine rode weekschild
Dermestes frischii
 Mierenkever
 Zeverstippelig lieveheersbeestje
 Elfstippelig lieveheersbeestje
 Duinzwartlijf
 Ingekepte smalboktor
 Gele bitterzoetaardvlo
 Elzensnuitkever
 Grijze bolsnuittor

Wantsen en cicaden

Aphrophora pectoradis
 Bloedcicade
 Zwartvoetje
 Gewone sigaar
 Smalle randwants
 Ruitrandwants
 Beenschildwants
 Groene schildwants
 Tweedoornsmallijf
 Biestarwewigkop
 Miersikkelwants

Overige insecten

Gewone oorworm
 Tuinbruinje
 Gewone stippelschietmot

Geleedpotigen

Bramenviltmijt
 Kruisspin
 Wesp spin
 Rietkruisspin
 Heidewielweb spin
 Bonte zak spin
 Grote tril spin
 Kraamweb spin
 Schorsmarpissa
 Huiszebraspin
 Rode hooiwagen

Gewone duizendpoot
Strandkrab
Fluwelen zwemkrab
Gewone zwemkrab
Standvlo
Mospissebed
Ruwe pissebed
Zwartkoppissebed
Orchesells cincta

Paddenstoelen

Grasleemhoed
Echte judasoor
Plooivoetstuiфzwam
Gekraagde aardster
Paardenhaartaailing
Zwavelzwam
Weidekringzwam
Veelhuizige populierenroest
Witte bultzwam
Afgeplatte stuiфzwam

Weekdieren

Noordkromp
Kokkel
Noorse hartschelp
Zaagje
Otterschelp
Grote strandschelp
Halfgeknotte strandschelp
Strandgaper
Afgeknotte gaper
Mossel
Japanse oester
Platte oester
Witte boormossel
Ruwe boormossel
Platte slijkgaper
Nonnetje
Tere platschelp
Venusschelp
Grijze tapiјtschelp
Filipijnse tapiјtschelp
Wulk
Gekielde noordhoren

Noordhoren
Gewone alikruik
Glanzende tepelhoorn
Zwartgerande tuinslak
Gewone zeekat

Zoogdieren

Konijn
Gewone zeehond
Grijze zeehond
Beverrat
Bruinvis

Bijlage: Lijst waargenomen plantensoorten

t/m 2025

waargenomen	waargenomen rodelijst soort
waargenomen in 2025	nieuw voor Rottumerplaat

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	<07	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Gewone esdoorn																				3
<i>Agrostis capillaris</i>	Gewoon struisgras																				3
<i>Agrostis gigantea</i>	Hoog struisgras																				
<i>Agrostis stolonifera</i>	Fioringras																				3
<i>Agrostis vinealis</i>	Zandstruisgras																				
<i>Aira praecox</i>	Vroege haver																				
<i>Allium schoenoprasum</i>	Bieslook																				3
<i>Ammi majus</i>	Groot akkerschem																				
<i>Ammophila arenaria</i>	Helm																				3
<i>Anagallis arvensis ssp. arvensis</i>	Rood guigelheil																				
<i>Aquilegia spec.</i>	Akelei																				
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Gewone zandmuur																				3
<i>Aribidopsis thaliana</i>	Zandraket																				3
<i>Armeria maritima</i>	Engels gras																				
<i>Artemisia vulgaris</i>	Bijvoet																				
<i>Asparagus officinalis officinalis</i>	Tuinasperge																				3
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Tongvaren																				
<i>Aster tripolium</i>	Zulte																				3
<i>Atriplex littoralis</i>	Strandmelde																				3
<i>Atriplex pedunculata</i>	Gesteelde Zoutmelde																				
<i>Atriplex portulacoides</i>	Gewone zoutmelde																				3
<i>Atriplex prostrata</i>	Spiesmelde																				3
<i>Bellis perennis</i>	Madellefje																				
<i>Beta vulgaris ssp. maritima</i>	Strandbiet																				3
<i>Blackstonia</i>	Herfst- of zomerbitterling																				
<i>Blysmus rufus</i>	Rode bies																				
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Heen																				3
<i>Brassica napus</i>	Koolzaad																				
<i>Bromus hordeaceus hordeaceus</i>	Zachte dravik																				
<i>Cakile maritima</i>	Zeeraket																				3
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Duinriet																				3
<i>Calammophila baltica</i>	Noordse helm																				
<i>Callitriche spec.</i>	Sterrenkroos																				
<i>Campanula medium</i>	Mariëtteklokje																				
<i>Campanula rapunculoides</i>	Akkerklokje																				
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Gewoon herderstasje																				

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	<07	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Cardamine hirsuta</i>	Kleine veldkers																				
<i>Carex arenaria</i>	Zandzegge																				
<i>Carex distans</i>	Zilte zegge																				
<i>Carex extensa</i>	Kwelderzegge																				
<i>Carex oederi</i> ssp. <i>oederi</i>	Dwergzegge																				
<i>Carex otrubae</i>	Valse Voszegge																				
<i>Centaureum littorale</i>	Strandduizendguldenkruid																				
<i>Centaureum pulchellum</i>	Fraai duizendguldenkruid																				
<i>Cerastium diffusum</i>	Scheve hoornbloem																				
<i>Cerastium fontanum</i> <i>vulgare</i>	Gewone hoornbloem																				
<i>Cerastium holosteoides</i>	Glanzige hoornbloem																				
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Zandhoornbloem																				
<i>Chamerion angustifolium</i>	Wilgenroosje																				
<i>Chelidonium majus</i>	Stinkende gouwe																				
<i>Chenopodium album</i>	Melganzenvoet																				
<i>Chenopodium rubrum</i>	Rode Ganzenvoet																				
<i>Cirsium arvense</i>	Akkerdistel																				
<i>Cirsium vulgare</i>	Speerdistel																				
<i>Claytonia perfoliata</i>	Witte winterpostelein																				
<i>Cochlearia danica</i>	Deens lepelblad																				
<i>Cochlearia officinalis</i> <i>anglica</i>	Engels lepelblad																				
<i>Convolvulus sepium</i>	Haagwinde																				
<i>Convolvulus soldanella</i>	Zeewinde																				
<i>Corispermum intermedium</i>	Smal vlieszaad																				
<i>Corynephorus canescens</i>	Buntgras																				
<i>Crambe maritima</i>	Zeekool																				
<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn																				
<i>Crepis capillaris</i>	Klein Streepzaad																				
<i>Dactylis glomerata</i>	Kropaar																				
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Vleeskleurige orchis																				
<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	Rietorchis																				
<i>Dactylorhiza x carnea</i>	Vleeskleurige x Gevlekte orchis																				
<i>Daucus carota</i> ssp. <i>ssativus</i>	Peen																				
<i>Descurainia sophia</i>	Sofiekruid																				
<i>Dianthus barbatus</i>	Duizendschoon																				
<i>Dianthus deltoides</i>	Steenanjer																				
<i>Digitalis purpurea</i>	Gewoon vingerhoedskruid																				
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalle stekelvaren																				
<i>Dryopteris dilatata</i>	Brede stekelvaren																				
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Mannetjesvaren																				

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	<07	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Elytrigia atherica</i>	Zeekweek																				3
<i>Elytrigia juncea boreoatlantica</i>	Biestarwegras																				3
<i>Elytrigia repens ssp. arenosa</i>	Kweek																				
<i>Epilobium ciliatum</i>	Beklierde basterd-wederik																				
<i>Epilobium hirsutum</i>	Harig wilgenroosje																				
<i>Epilobium parviflorum</i>	Viltige basterdwederik																				3
<i>Epilobium tetragonum</i>	Kantige basterdwederik																				
<i>Epipactis helleborine</i>	Brede wespenorchis																				3
<i>Epipactis palustris</i>	Moeraswespenorchis																				
<i>Erigeron acer</i>	Scherpe fijnstraal																				
<i>Erigeron canadensis</i>	Canadese fijnstraal																				3
<i>Erodium cicutarium dunense</i>	Duinreigersbek																				3
<i>Erophila verna</i>	Vroegeling																				3
<i>Eryngium maritimum</i>	Blauwe zeedistel																				
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Koninginnekruid																				
<i>Euphorbia paralias</i>	Zeewolfsmelk																				3
<i>Fallopia convolvulus</i>	Zwaluw tong																				
<i>Festuca arenaria</i>	Duinzwengras																				3
<i>Festuca arundinacea</i>	Rietzwengras																				
<i>Festuca rubra</i>	Rood zwengras																				3
<i>Ficaria verna</i>	Speenkruid																				
<i>Filago minima</i>	Dwergviltkruid																				
<i>Fumaria officinalis</i>	Gewone duivekervel																				
<i>Galeopsis bifida</i>	Gespleten hennepnetel																				3
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewone hennepnetel																				
<i>Galium aparine</i>	Kleefkruid																				3
<i>Galium mollugo</i>	Glad walstro																				3
<i>Galium palustre</i>	Moeraswalstro																				
<i>Galium uliginosum</i>	Ruw walstro																				
<i>Galium verum</i>	Geel walstro																				
<i>Geranium dissectum</i>	Slipbladige ooievaarsbek																				
<i>Geranium lucidum</i>	Glanzige ooievaarsbek																				
<i>Geranium molle</i>	Zachte ooievaarsbek																				3
<i>Geranium robertianum</i>	Robertskruid																				
<i>Glaucium flavum</i>	Gele hoempapaver																				3
<i>Glaux maritima</i>	Melkkruid																				3
<i>Glechoma hedracea</i>	Hondsdrif																				3
<i>Helianthus annuus</i>	Zonnebloem																				
<i>Hieracium umbellatum</i>	Schemhavikskruid																				3
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Duindoorn																				3

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	<07	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Holcus lanatus</i>	Gestreepte witbol																				3
<i>Honckenya peploides</i>	Zeepstelein																				
<i>Hordeum vulgare</i>	Gerst																				
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewoon biggekruid																				3
<i>Inula crithmoides</i>	Zeealant																				
<i>Jacobaea vulgaris dunensis</i>	Duinkruiskruid													?							
<i>Juncus alpinoarticulatus atricapillus</i>	Duinrus																				
<i>Juncus ambiguus</i>	Zilte greppelrus																				3
<i>Juncus bufonius</i>	Greppelrus																				
<i>Juncus gerardi</i>	Zilte rus																				3
<i>Juncus maritimus</i>	Zeerus																				
<i>Lamium hybridum</i>	Ingesneden dovenetel																				
<i>Lamium purpureum</i>	Paarse dovenetel																				
<i>Lathyrus pratensis</i>	Veldlathyrus																				
<i>Leontodon autumnalis</i>	Vertakte leeuwentand																				
<i>Leontodon saxatilis</i>	Kleine leeuwentand																				3
<i>Leymus arenarius</i>	Zandhaver																				3
<i>Ligustrum vulgare</i>	Wilde liguster																				3
<i>Limonium vulgare</i>	Lamsoor																				3
<i>Linaria vulgaris</i>	Viasbekje																				3
<i>Linum catharticum</i>	Geelharte																				
<i>Lolium perenne</i>	Engels raaigras																				
<i>Lotus corniculatus var corniculatus</i>	Gewone rolklaver																				3
<i>Luzula campestris</i>	Gewone veldbies																				
<i>Lychnis coronaria</i>	Prikneus																				3
<i>Lycium barbarum</i>	Boksdoo																				
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfspoot																				3
<i>Malus spec.</i>	Appel																				3
<i>Malva moschata</i>	Muskuskaasjeskruid																				
<i>Mentha aquatica</i>	Watermunt																				
<i>Myosotis arvensis</i>	Aktervergeet-mij-nietje																				3
<i>Myosotis ramosissima</i>	Ruw vergeet-mij-nietje																				3
<i>Narcissus spec.</i>	Narcis spec.																				3
<i>Odontites vernus serotinus</i>	Rode ogentroost																				
<i>Oenanthe lacheganalii</i>	Zilt Torkruid																				
<i>Oenothera oakesiana</i>	Duinteunisbloem																				3
<i>Oenothera parviflora</i>	Kleine teunisbloem																				3
<i>Ononis repens spinosa</i>	Kattendoorn																				
<i>Oxalis corniculata</i>	Gehoornde klaverzuring																				3
<i>Papaver orientale</i>	Oosterse klaproos																				

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	<07	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Papaver rhoeas</i>	Gewone klaproos																				
<i>Papaver somniferum</i>	Slaapbol																				
<i>Parapholis strigosa</i>	Dunstaart																				3
<i>Persicaria maculosa</i>	Perzikkruid																				
<i>Phragmites australis</i>	Riet																				3
<i>Plantago coronopus</i>	Hertshoomweegbree																				3
<i>Plantago lanceolata</i>	Smalle weegbree																				
<i>Plantago major major</i>	Grote weegbree																				
<i>Plantago maritima</i>	Zeeweegbree																				
<i>Poa annua</i>	Straatgras																				3
<i>Poa pratensis</i>	Veldbeemdgras																				3
<i>Poa trivialis</i>	Ruw beemdgras																				
<i>Polygonum aviculare</i>	Gewoon varkensgras																				
<i>Polypodium interjectum</i>	Brede eikvaren																				
<i>Polypodium vulgare</i>	Gewone eikvaren																				3
<i>Populus alba</i>	Witte abeel																				3
<i>Populus nigra</i>	Zwarte populier																				3
<i>Potentilla anserina</i>	Zilverschoon																				3
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewone brunel																				
<i>Puccinellia distans ssp. borealis</i>	Bleek Kweldergras																				
<i>Puccinellia distans ssp. distans</i>	Stomp kweldergras																				
<i>Puccinellia maritima</i>	Gewoon kweldergras																				3
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Heelblaadjes																				
<i>Ranunculus acris</i>	Scherpe boterbloem																				
<i>Ranunculus repens</i>	Kruipende boterbloem																				
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Blaartrekkende boterbloem																				
<i>Ribes rubrum</i>	Aalbes																				3
<i>Ribes uva-crispa</i>	Kruisbes																				
<i>Rosa Canina</i>	Hondsroos																				
<i>Rosa rubiginosa</i>	Egelantier																				
<i>Rosa rugosa</i>	Rimpelroos																				3
<i>Rubus caesius</i>	Dauwbraam																				3
<i>Rumex acetosa</i>	Veldzuring																				
<i>Rumex acetosella</i>	Schapenzuring																				
<i>Rumex conglomeratus</i>	Kluwenzuring																				3
<i>Rumex crispus</i>	Krulzuring																				3
<i>Rumex hydropalathum</i>	Waterzuring																				
<i>Rumex palustris</i>	Moeraszuring																				
<i>Sagina apetala</i>	Donkere vetmuur																				3
<i>Sagina maritima</i>	Zeevetmuur																				3

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	<07	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Sagina nodosa</i>	Sierlijke vetmuur																				
<i>Sagina procumbens</i>	Liggende vetmuur																				3
<i>Salicornia europaea</i>	Kortarige zeekraal																				3
<i>Salicornia procumbens</i>	Langarige zeekraal																				3
<i>Salix alba</i>	Schietwilg																				3
<i>Salix cinerea cinerea</i>	Grauwe wilg																				3
<i>Salix daphnoides</i>	Berijpte wilg																				3
<i>Salix repens</i>	Kruipwilg																				3
<i>Salix triandra</i>	Amandelwilg																				
<i>Salsola kali kali</i>	Stekend loogkruid																				3
<i>Salsola kali ruthenica</i>	Loogkruid																				
<i>Sambucus nigra</i>	Gewone vlier																				3
<i>Sambucus nigra cv. laciniata</i>	Peterselvlier																				3
<i>Schoenus nigricans</i>	Knopbies																				
<i>Sedum acre</i>	Muurpeper																				3
<i>Senecio inaequidens</i>	Bezemkruiskruid																				
<i>Senecio jacobaea</i>	Jacobskruiskruid																				3
<i>Senecio sylvaticus</i>	Boskruiskruid																				
<i>Senecio viscosus</i>	Kleverig kruiskruid																				3
<i>Senecio vulgaris</i>	Klein kruiskruid																				3
<i>Seriphidium maritimum</i>	Zeealsem																				
<i>Sherardia arvensis</i>	Blauw walstro																				3
<i>Silene dioica</i>	Dagkoekoeksbloem																				3
<i>Silene flos-cuculi</i>	Echte koekoeksbloem																				
<i>Silene latifolia</i>	Avondkoekoeksbloem																				
<i>Sinapis arvensis</i>	Herik																				
<i>Solanum dulcamara</i>	Bitterzoet																				3
<i>Solanum nigrum nigrum</i>	Zwarte nachtschade																				3
<i>Solanum tuberosum</i>	Aardappel																				3
<i>Sonchus arvensis var. maritimus</i>	Zeemelkdistel																				3
<i>Sonchus asper</i>	Gekroesde melkdistel																				3
<i>Sonchus oleraceus</i>	Gewone melkdistel																				
<i>Sorbus aucuparia</i>	Wilde lijsterbes																				
<i>Spartina anglica</i>	Engels slijkgras																				3
<i>Spergularia marina</i>	Zilte schijnspurrie																				3
<i>Spergularia media angustata</i>	Gerande schijnspurrie																				3
<i>Stellaria graminea</i>	Grasmuur																				3
<i>Stellaria media</i>	Vogelmuur																				3
<i>Stellaria pallida</i>	Duinvogelmuur																				3
<i>Suaeda maritima</i>	Klein schorrenkruid																				3

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	<07	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Symphytum officinale</i>	Gewone smeerwortel																				
<i>Tanacetum parthenium</i>	Moederkruid																				
<i>Taraxacum laevigatum</i>	Zandpaardebloem																				3
<i>Taraxacum officinale</i>	Gewone paardebloem																				3
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine ruit																				3
<i>Thlaspi arvense</i>	Witte krodde																				
<i>Trifolium arvense</i>	Hazepootje																				
<i>Trifolium fragiferum</i>	Aardbeiklaver																				3
<i>Trifolium pratense</i>	Rode klaver																				3
<i>Trifolium repens</i>	Witte klaver																				3
<i>Triglochin maritima</i>	Schorrenzoutgras																				3
<i>Tripleurospermum maritimum</i>	Reukeloze kamille																				3
<i>Typha latifolia</i>	Grote lisdodde																				3
<i>Urtica dioica</i>	Grote brandnetel																				3
<i>Urtica urens</i>	Kleine brandnetel																				3
<i>Verbascum hybride</i>	Toorts hybride																				
<i>Verbascum nigrans</i>	Zwarte toorts																				
<i>Verbascum thapsus</i>	Koningskaars																				
<i>Veronica arvensis</i>	Veldereprijs																				3
<i>Veronica officinalis</i>	Mannetjesereprijs																				3
<i>Vicia cracca</i>	Vogelwikke																				3
<i>Vicia hirsuta</i>	Ringelwikke																				
<i>Vicia lathyroides</i>	Lathyruswikke																				
<i>Vicia sativa nigra</i>	Smalle wikke																				3
<i>Viola curtisii</i>	Duinviooltje																				
<i>Zostera marina</i>	Groot zeegras																				
<i>Zostera noltii</i>	Klein Zeegras																				
Totaal aantal soorten		259	150	142	150	147	154	158	137	140	123	135	120	123	156	144	166	151	?	139	155
Jaar		<07	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25